



# 181 Calamus Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

**Mischung zum Einnehmen**  
**Zusammensetzung:** 10 g (= 10,88 ml) Mischung enthalten:  
 Arzneilich wirksame Bestandteile: Calamus aromaticus D3 Dil.,  
 Collinsonia canadensis D2 Dil., Acidum phosphoricum D3 Dil.,  
 Carum carvi D4 Dil., Colocynthis D4 Dil., Chamomilla D2 Dil.,  
 Carbo vegetabilis D8 Dil., Momordica balsamina D3 Dil.,  
 Cyclamen D3 Dil. je 1,1111 g  
 Dieses Präparat enthält 55,6 Vol.-% Alkohol.  
 Packungsbeilage beachten!  
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer  
 therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden  
 Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.  
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!  
 Reg.-Nr.: 2512428.00.00 Apothekenpflichtig  
 Inhalt: 50 ml

**Ch.-B.: 0000**      **Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation**  
**181 Calamus Komplex**  
 Homöopathisches Arzneimittel  
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml  
 1 g entspricht 22 Tropfen

**Anwendungsgebiete:**  
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne  
 Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweise:  
 siehe Rückseite.  
**Gegenanzeigen:**  
 Wann dürfen Sie 181 Calamus Komplex nicht  
 einnehmen?  
 181 Calamus Komplex soll bei bekannter  
 Überempfindlichkeit gegen Kamille und andere

Korbblütler sowie wegen des Alkoholgehaltes bei  
 Alkoholkranken nicht angewendet werden.  
 Wann dürfen Sie 181 Calamus Komplex erst nach  
 Rücksprache mit dem Arzt anwenden?  
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 181 Calamus Komplex  
 bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit  
 organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach  
 Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und  
 Warnhinweise:**  
 Warnhinweis:  
 Dieses Arzneimittel enthält 55,6 Vol.-% Alkohol.  
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung  
 werden bis zu 0,33 g Alkohol zugeführt.  
 Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei

Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,  
 Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für  
 Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer  
 Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.  
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit  
 beachten?  
 Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur  
 Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit  
 vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache  
 mit dem Arzt angewendet werden.  
 Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:  
 Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen  
 keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es  
 soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht  
 angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**  
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite  
**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**  
 Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen  
 vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel  
 Wasser einnehmen.  
 Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der  
 Einnahme zu reduzieren.  
**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite  
**Nebenwirkungen:** Keine bekannt.  
 Hinweis: siehe Rückseite.  
**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des  
 Arzneimittels:**  
 siehe Rückseite  
**Stand der Information:** März 2016