

Erhaltungsdosis	
Die empfohlene Erhaltungsdosis beträgt einmal täglich 20 mg. Bitte wenden Sie sich zur Fortsetzung der Behandlung an Ihren Arzt.	
Dosierung bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion	
Wenn Ihre Nierenfunktion eingeschränkt ist, entscheidet Ihr Arzt über eine Dosierung, die Ihrem Krankheitszustand entspricht. In diesem Fall sollte Ihre Nierenfunktion in regelmäßigen Abständen durch Ihren Arzt überwacht werden.	
Anwendung	
Memantinhydrochlorid-Hormosan sollte einmal täglich eingenommen werden. Damit das Arzneimittel bei Ihnen optimal wirken kann, sollten Sie es regelmäßig jeden Tag zur gleichen Zeit einnehmen.	Die Filmtabletten sollten mit etwas Wasser geschluckt werden. Die Filmtabletten können mit oder ohne Nahrung eingenommen werden.
Dauer der Behandlung	
Setzen Sie die Einnahme von Memantinhydrochlorid-Hormosan fort, solange das Arzneimittel für Sie wirksam ist. Die Behandlung sollte regelmäßig durch einen Arzt beurteilt werden.	
Wenn Sie eine größere Menge von Memantinhydrochlorid-Hormosan eingenommen haben, als Sie sollten	
Normalerweise sollte eine Überdosierung von Memantinhydrochlorid-Hormosan zu keinen schädlichen Wirkungen führen. Die unter Abschnitt 4 „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“ genannten Symptome treten bei einer Überdosierung möglicherweise in verstärktem Maße auf.	Im Falle einer starken Überdosierung wenden Sie sich an Ihren Arzt oder holen Sie sich medizinischen Rat, da Sie möglicherweise eine medizinische Behandlung brauchen.
Wenn Sie die Einnahme von Memantinhydrochlorid-Hormosan vergessen haben	
Wenn Sie die Einnahme einer Dosis vergessen haben, nehmen Sie einfach beim nächsten Mal Memantinhydrochlorid-Hormosan zur gewohnten Zeit ein. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.	Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.	<i>Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen)</i>
Wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen bemerken wie Krampfanfälle, Suizidgedanken oder -absichten haben, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt oder Apotheker.	■ Krampfanfälle.
Im Allgemeinen sind die beobachteten Nebenwirkungen leicht bis mittelschwer.	<i>Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)</i>
<i>Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)</i>	■ Entzündung der Bauchspeicheldrüse, Entzündung der Leber (Hepatitis) und psychotische Reaktionen. Alzheimer-Demenz wird mit Depression, Suizidgedanken und Suizid in Verbindung gebracht. Solche Ereignisse wurden bei Patienten berichtet, die mit Memantin behandelt wurden.
■ Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Verstopfung, erhöhte Leberfunktionswerte, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Kurzatmigkeit, erhöhter Blutdruck und Arzneimittelüberempfindlichkeitsreaktionen.	Meldung von Nebenwirkungen
<i>Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)</i>	Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de , anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.
■ Müdigkeit, Pilzinfektionen, Verwirrtheit, Halluzinationen, Erbrechen, anomaler Gang, Herzleistungsschwäche und venöse Blutgerinnsel (Thrombosen/Thromboembolien).	

5. Wie ist Memantinhydrochlorid-Hormosan aufzubewahren?

■ Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
■ Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung nach „Verwendbar bis“ bzw. „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
■ Nicht über 25 °C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

■ Was Memantinhydrochlorid-Hormosan enthält Der Wirkstoff ist Memantinhydrochlorid. Jede 10 mg Filmtablette enthält 10 mg Memantinhydrochlorid, entsprechend 8,31 mg Memantin. Jede 20 mg Filmtablette enthält 20 mg Memantinhydrochlorid, entsprechend 16,62 mg Memantin. Die sonstigen Bestandteile sind: <u>Tablettenkern</u> Mikrokristalline Cellulose, Siliciumdioxid-beschichtet Croscarmellose-Natrium Talkum Magnesiumstearat (Ph.Eur.) <u>Filmüberzug</u> Hypromellose Titandioxid (E 171) Macrogol 400 <i>Memantinhydrochlorid-Hormosan 20 mg zusätzlich:</i> Eisen(III)-oxid (E 172) ■ Wie Memantinhydrochlorid-Hormosan aussieht und Inhalt der Packung	 Memantinhydrochlorid-Hormosan 20 mg Filmtabletten sind rosabraune, ovale Filmtabletten, Größe ca. 14 x 7 mm, mit der Prägung „20“ auf der einen und Bruchrille auf der anderen Seite. Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt werden. ■ Inhalt der Packung Memantinhydrochlorid-Hormosan ist in PVC/Al Blisterpackungen mit 42 und 98 Filmtabletten erhältlich. ■ Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller Hormosan Pharma GmbH Hanauer Landstraße 139 ■ 60314 Frankfurt am Main Tel.: (0 69) 47 87 30 ■ Fax: (0 69) 47 87 316 E-Mail: info@hormosan.de ■ www.hormosan.de Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen: Portugal: Memantina Lupin Vereinigtes Königreich: Memantine hydrochloride Lupin 10 mg and 20 mg Film coated tablets Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2018.
 Memantinhydrochlorid-Hormosan 10 mg Filmtabletten sind weiße bis cremefarbene, ovale Filmtabletten, Größe ca. 11 x 6 mm, mit der Prägung „10“ auf der einen und Bruchrille auf der anderen Seite. Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt werden.	Mat.-Nr. memxx9a    HORMOSAN PHARMA