



126

Lobelia

F Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung: 10 g (= 10,78 ml) Mischung enthalten:
 Arzneilich wirksame Bestandteile: Lobelia inflata Dil. D4,
 Valeriana Dil. D3, Aconitum Dil. D4, Arsenicum album Dil.
 D6, Hyoscyamus Dil. D4, Stramonium Dil. D4,
 Strychninum nitricum Dil. D4 je 1,4286 g
 Dieses Präparat enthält 52,7 Vol.-% Alkohol.
 Packungsbeilage beachten!
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe
 einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung
 fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat
 einzuholen.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
 Reg.-Nr.: 2512436.00.00 Apothekenpflichtig
 Inhalt: 50 ml
Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
126 Lobelia F Komplex
 Homöopathisches Arzneimittel
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
 1 g entspricht 21 Tropfen

Anwendungsgebiete:
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
 Angabe einer therapeutischen Indikation.
 Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
 Wann dürfen Sie 126 Lobelia F Komplex nicht
 einnehmen?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 126 Lobelia F Komplex
 bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.
 Wann dürfen Sie 126 Lobelia F Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 126 Lobelia F Komplex
 bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit
 organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach
 Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und
 Warnhinweise:**
 Warnhinweis:
 Dieses Arzneimittel enthält 52,7 Vol.-% Alkohol.
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung
 werden bei der Akutdosierung bis zu 0,64 g Alkohol und
 bei der chronischen Dosierung bis zu 0,32 g Alkohol
 zugeführt.
 Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei
 Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken
 oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und

Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann
 beeinträchtigt oder verstärkt werden.
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit
 beachten? Da keine ausreichend dokumentierten
 Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der
 Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit
 dem Arzt angewendet werden.
 Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
 Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
 keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es
 soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht
 angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
 Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle

halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5
 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem
 Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne
 medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.
 Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen
 mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.
 Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der
 Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
 Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
 siehe Rückseite
Stand der Information: März 2016