, ====	162	Mischung zum Einnehmen	Gebrauchsinformation	Überempfindlichkeit gegen Bellis perennis (Gänseblümchen) oder andere Korbblütler nicht	Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken,	
* ====	102	Zusammensetzung:	162 Vinca minor Komplex	(Gänseblümchen) oder andere Korbblütler nicht	Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder	Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
o ■	Vinca	10 g (= 10,93 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame	Homöopathisches Arzneimittel	anzuwenden.		Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle
· =	VIIICa	Bestandteile: Vinca minor Dil. D3. Bellis perennis Dil. D3.	Missburg Original pool upgap au 20 upg 50 ml	Wann dürfen Sie 162 Vinca minor Komplex erst nach		
~ = =	minor	Destanciene. Vinca minor dil. Do, dellis perennis dil. Do,	Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml			halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5
	IIIIIIIII	Paeonia officinalis Dil. D2, Ratanhia Dil. D4, Sarsaparilla Dil. D3,	1 g entspricht 22 Tropfen	Rücksprache mit dem Arzt anwenden?	verstärkt werden.	Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem
0	Komplex	Thuja Dil. D3, Viola tricolor Dil. D2, Dolichos pruriens Dil. D4 je		Wegen des Alkoholgehaltes soll 162 Vinca minor Komplex	Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit	Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne
		1.25 a	Anwendungsgebiete:	bei Leberkranken. Epileptikern und Personen mit		medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.
m ===	Homöopathisches	Dieses Präparat enthält 58.0 Vol% Alkohol.	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne	organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach		Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen
	Arzneimittel	Packungsbeilage beachten!	Registrieries riornoopatriiscries Arzheinitter, daner onne			
<u> </u>	,	Davietriettee henzienethiechee Armeinittel deber ehne Anache einer	Angabe einer therapeutischen Indikation.	Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.	Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit	mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der
		therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden	Hinweise: siehe Rückseite.	Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und	dem Arzt angewendet werden.	Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu
°==		Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.	Gegenanzeigen:	Warnhinweise:	Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:	reduzieren.
		Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!	Wann dürfen Sie 162 Vinca minor Komplex nicht	Warnhinweis:	Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen	Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
		Anothekennflichtig	einnehmen?	Dieses Arzneimittel enthält 58.0 Vol% Alkohol.	keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll	Nebenwirkungen: Keine bekannt, Hinweis: siehe Rückseite.
0		Apothekenpflichtig RegNr.: 2512441.00.00 Inhalt: 50 ml	Wegen des Alkoholgehaltes soll 162 Vinca minor Komplex	Als maximale Tagesgahe nach der Dosierungsanleitung	deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet	Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
		110g. 11 2012 111.00.00 Illinaia. 00 Illi	bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.	werden bei der Akutdosierung bis zu 0.7 g Alkohol und bei	worden	siehe Rückseite
*		ChB.: 0000 Verwendbar bis 00/0000				
		On-D., 0000 FCI #6110001 DIS 00/0000	162 Vinca minor Komplex ist bei bekannter	der chronischen Dosierung bis zu 0,34 g Alkohol zugeführt.	wecnseiwirkungen mit anderen Mitteln:	Stand der Information: Mai 2016