



26

Uva ursi Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
 10 ml Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Juniperus communis D4 Dil., Oleum terebinthinae (HAB 1934) D4 Dil. (HAB, Vorschr. 5a), Belladonna D4 Dil., Cantharis D4 Dil., Causticum Hahnemanni D4 Dil., Cuprum aceticum D4 Dil., Pulsatilla D4 Dil., Sulfur D6 Dil., Thuja D3 Dil., Sabal serrulatum D2 Dil., Liatris spicata (HAB 1934) D4 Dil. (HAB, Vorschr. 3a), Uva ursi D4 Dil. je 0,8333 ml
 Dieses Präparat enthält 58,3 Vol.-% Alkohol.
 Packungsbeilage beachten!
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
 Reg.-Nr.: 482.00.00 Apothekenpflichtig
 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
26 Uva ursi Komplex
 Homöopathisches Arzneimittel
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

Anwendungsgebiete:
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
 Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
 Wann dürfen Sie 26 Uva ursi Komplex nicht einnehmen?
 26 Uva ursi Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei einer Überempfindlichkeit gegen Terpentin nicht angewendet werden.
 Wann dürfen Sie 26 Uva ursi Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 26 Uva ursi Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
 Warnhinweis:
 Dieses Arzneimittel enthält 58,3 Vol.-% Alkohol.
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,25 g Alkohol zugeführt.
 Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann

beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
 Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?
 Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung. Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich je 5 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser vor den Mahlzeiten einnehmen.
 Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
 1 ml entspricht etwa 25 Tropfen
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
 Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
 siehe Rückseite
Stand der Information: April 2016