



164

Bellis

Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

Zusammensetzung:

10 g (= 10,92 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euphorbium Dil. D4, Abrotanum Dil. D2, Bellis perennis Dil. D2, Borax Dil. D4, Lachesis Dil. D10, Ranunculus bulbosus Dil. D3, Rhus toxicodendron Dil. D4, Viola tricolor Dil. D2, Yucca filamentosa Dil. D2, Hydrocotyle asiatica Dil. D4 je 1 g. Dieses Präparat enthält 58,0 Vol.-% Alkohol. Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nicht über 25 °C aufbewahren! Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2512424.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

164 Bellis Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

1 g entspricht 22 Tropfen.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 164 Bellis Komplex nicht einnehmen?

164 Bellis Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei einer Überempfindlichkeit

gegen Giftsumachgewächse nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 164 Bellis Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 164 Bellis Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und

Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 58,0 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der

Dosierungsanleitung werden bis zu 0,33 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,

Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer

Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden. Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen

vorliegen, sollte das Arzneimittel in der

Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache

mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen

keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es

soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht

angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 1-3mal täglich je 5 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser vor den Mahlzeiten einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des

Arzneimittels: siehe Rückseite

Stand der Information: Mai 2016