


Naloxon/naloxona
nasal en envasé nidosis
solución para pulverización
im Einzeldosisbehältnis
Nasenspray, Lösung
NYXOID 1,8 mg



NYXOID 1.8 mg
nasal spray, solution
in single-dose container
naloxone

Package leaflet: Information for the user
Nyxoid 1.8 mg
nasal spray, solution
in single-dose container
naloxone

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist or nurse.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet

1. What Nyxoid is and what it is used for
2. What you need to know before you receive Nyxoid
3. How Nyxoid is to be given
4. Possible side effects
5. How to store Nyxoid
6. Contents of the pack and other information

1. What Nyxoid is and what it is used for

This medicine contains the active substance naloxone. Naloxone temporarily reverses the effects of opioids such as heroin, methadone, fentanyl, oxycodone, buprenorphine and morphine.

Nyxoid is a nasal spray used for the emergency treatment of opioid overdose or possible opioid overdose in adults and adolescents over 14 years. Signs of overdose include:

- breathing problems

- severe sleepiness
 - not responding to a loud noise or touch.
- If you are at risk of an opioid overdose you should always carry your Nyxoid with you. Nyxoid works for a short time only to reverse the effects of opioids while you wait for emergency medical attention. It is not a substitute for emergency medical care. Nyxoid is intended for use by appropriately trained individuals. Always tell your friends and family that you carry Nyxoid with you.

2. What you need to know before you receive Nyxoid

Do not use Nyxoid

If you are allergic to naloxone or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).

Warnings and precautions

Nyxoid will be supplied to you only after you or your carer have been taught how to use it. It is to be given right away and does not take the place of emergency medical care.

• Emergency services should be called if an opioid overdose is suspected.

The signs and symptoms of an opioid overdose can return after this nasal spray is given. If this happens, further doses may be given after 2 to 3 minutes using a new nasal spray. The patient should be monitored closely until emergency help has arrived after being given this medicine.

Conditions to look out for

- If you are physically dependent on opioids or if you have received high doses of opioids (for example heroin, methadone, fentanyl, oxycodone, buprenorphine or morphine). You may get strong withdrawal symptoms with this medicine (see later in section 4 of this leaflet under 'Conditions to look out for')
- If you take opioids to control pain. The pain may increase when you receive Nyxoid.
- If you use buprenorphine. Nyxoid may not fully reverse breathing problems.

Tell your doctor if you have damage to the inside of your nose as this could affect how Nyxoid works.

Children and adolescents

Nyxoid is not for use in children or adolescents under 14 years.

Receiving Nyxoid close to giving birth

Tell your midwife or doctor if you have received Nyxoid close to or during labour.

Your baby could suffer from sudden opioid withdrawal syndrome, which could be life-threatening if not treated. Watch out for the following symptoms in your baby during the first 24 hours after the baby is born:

- seizures (fits)
- crying more than usual
- increased reflexes.

Other medicines and Nyxoid

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

Pregnancy, breast-feeding and fertility

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before receiving a supply of this medicine. If you are given Nyxoid while you are pregnant or breast-feeding, your baby should be closely monitored.

Driving and using machines

After taking this medicine, you must not drive, operate machinery or engage in any other physically or mentally demanding activity for at least 24 hours, since the effects of opioids may recur.

Nyxoid contains sodium

This medicine contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, that is to say essentially 'sodium-free'.

3. How Nyxoid is to be given

Always use this medicine exactly as your doctor, pharmacist or nurse has told you. Check with your doctor, pharmacist or nurse if you are not sure. Training will be provided on how to use Nyxoid before it is supplied to you. Below is a step by step guide.

Instructions for giving Nyxoid nasal spray

1. Check for symptoms and response.
2. Call for an ambulance.
3. Peel off the back of the blister from the corner to remove the nasal spray from the container. Place the nasal spray within easy reach.
4. Lay the patient on their back. Support the back of the neck and allow the head to tilt back. Clear away anything blocking their nose.

2. Call for an ambulance.

- Nyxoid is not a substitute for emergency medical care.
1. Allergic reactions such as swelling of the face, mouth, lips or throat, allergic shock
 2. Life-threatening irregular heartbeat, heart attack
 3. Build-up of fluid in the lungs
 4. Skin problems such as itching, rash, redness, swelling, severe flaking or peeling of the skin.

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via:

HPRU Pharmacovigilance Website: www.hpru.ie

By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Nyxoid

Keep this medicine out of the sight and reach of children. Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton, blister pack and the label after EXP. The expiry date refers to the last day of that month.

Do not freeze.
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. Contents of the pack and other information

What Nyxoid contains

- The active substance is naloxone. Each nasal spray contains 1.8 mg of naloxone (as hydrochloride dihydrate).
- The other ingredients are trisodium citrate dihydrate (E331), sodium chloride, hydrochloric acid (E507), sodium hydroxide (E524) and purified water (see "Nyxoid contains sodium" in section 2).

In patients who are unconscious and not breathing normally additional life-saving support should be given if possible.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects although not everyone gets them. The side effects below may happen with this medicine.

Conditions to look out for

Nyxoid can cause acute withdrawal symptoms if the patient is dependent on opioid drugs. Symptoms can include: drug withdrawal syndrome include: restlessness, irritability, hyperaesthesia (increased skin sensitivity), nausea (feeling sick), vomiting (being sick), gastrointestinal pain (stomach cramps), muscle spasms (a sudden tightening of your muscles, body aches), dysphoria (unpleasant or uncomfortable mood), insomnia (difficulty in sleeping), anxiety, hyperhidrosis (excessive sweating), piloerection (goose bumps, shivering or trembling), tachycardia (fast heart rate), increased blood pressure, yawning, pyrexia (fever). Behavioural

changes including violent behaviour, nervousness and excitement may also be observed.

Acute withdrawal symptoms occur uncommonly (may affect up to 1 in 100 people).

Tell your doctor if you experience any of these symptoms. Very common: may affect more than 1 in 10 people

Common: may affect up to 1 in 10 people

Dizziness, headache

Fast heart rate

High blood pressure, low blood pressure

Being sick (vomiting)

Uncommon: may affect up to 1 in 100 people

Tremor

Slow heart rate

Sweating

Irregular heart beat

Diarrhoea

Dry mouth

Rapid breathing

Very rare: may affect up to 1 in 10,000 people

Allergic reactions such as swelling of the face, mouth, lips or throat, allergic shock

Life-threatening irregular heartbeat, heart attack

Build-up of fluid in the lungs

Skin problems such as itching, rash, redness, swelling, severe flaking or peeling of the skin.

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via:

HPRU Pharmacovigilance Website: www.hpru.ie

By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Nyxoid

Keep this medicine out of the sight and reach of children. Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton, blister pack and the label after EXP. The expiry date refers to the last day of that month.

Do not freeze.
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn die Innenseite Ihrer Nase verletzt ist, da dies die Wirkung von Nyxoid beeinflussen könnte.

Kinder und Jugendliche

Nyxoid ist nicht zur Anwendung bei Kindern oder Jugendlichen unter 14 Jahren bestimmt.

Nyxoid-Gabe kurz vor einer Geburt

Informieren Sie Ihre Hebammme oder Ihren Arzt, wenn Sie Nyxoid kurz vor oder während der Wehen erhalten haben.

Ihr Kind könnte ein plötzliches Opioidentzugssyndrom erleiden, das lebensbedrohlich sein kann, wenn es nicht behandelt wird.

Achten Sie bei Ihrem Kind während der ersten 24 Stunden nach der Geburt auf folgende Symptome:

- Krampfanfälle (Anfälle)
- häufigeres Weinen als gewöhnlich
- erhöhte Reflexe

Anwendung von Nyxoid zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Aushändigung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wenn Sie Nyxoid während Ihrer Schwangerschaft erhalten oder während Sie stillen, muss Ihr Kind engmaschig überwacht werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

1. Was ist Nyxoid und wofür wird es angewendet?

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Nyxoid beachten?

3. Wie ist Nyxoid anzuwenden?

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

5. Wie ist Nyxoid aufzubewahren?

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Manufacturer

Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16
3832 RC Leusden
Netherlands

For any information about this medicine, please contact the local representative of the Marketing Authorisation Holder:

Ireland

Mundipharma Pharmaceuticals Limited
Tel +353 1 206 3800

This leaflet was last revised in 02/2023.

Detailed information on this medicine is available on the European Medicines Agency web site: <http://www.ema.europa.eu>

1. Was ist Nyxoid und wofür wird es angewendet?

Dieses Arzneimittel enthält den Wirkstoff Naloxon. Naloxon hebt vorübergehend die Wirkungen von Opioiden wie Heroin, Methadon, Fentanyl, Oxycodon, Buprenorphin und Morphin auf. Nyxoid ist ein Nasenspray zur Notfallbehandlung bei Opioid-Überdosierung oder vermuteter Opioid-Überdosierung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren. Zu den Anzeichen einer Überdosierung gehören:

- Atembeschwerden
- Schwere Schläfrigkeit
- Keine Reaktion auf ein lautes Geräusch oder auf Berührung

Wenn bei Ihnen ein Risiko für eine Opioid-Überdosierung besteht, sollten Sie stets Nyxoid bei sich tragen. Nyxoid bewirkt nur für einen kurzen Zeitraum, dass die Wirkungen der Opiode aufgehoben werden, während Sie auf den Notarzt warten. Es ersetzt nicht die Behandlung durch einen Notarzt. Nyxoid ist für die Anwendung durch entsprechend geschulte Personen bestimmt.

Sagen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie immer Bescheid, dass Sie Nyxoid bei sich tragen.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Nyxoid beachten?

Nyxoid darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Naloxon oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Nyxoid wird Ihnen erst ausgehändiggt, nachdem Sie oder Ihr Betreuer in der Anwendung unterwiesen wurden.

Es muss umgehend verabreicht werden und ist kein Ersatz für eine medizinische Notfallbehandlung.

• Bei Verdacht auf eine Opioid-Überdosierung ist der Notarzt zu rufen.

Die Anzeichen und Symptome einer Opioid-Überdosierung können nach Anwendung dieses Nasensprays erneut auftreten. Wenn dies der Fall ist, können Sie nach 2 bis 3 Minuten weitere Dosen mit einem neuen Nasenspray erhalten. Der Patient muss nachdem er dieses Arzneimittel erhalten hat engmaschig überwacht werden, bis der Notarzt eingetroffen ist.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Die unten angegebenen Nebenwirkungen können unter diesem Arzneimittel auftreten.

Symptome, auf die Sie achten müssen

- Nyloid kann akute Entzugssymptome hervorrufen, wenn der Patient opioidabhängig ist. Symptome können sein: Arzneimittalentzugsynonym einschließlich Ruhelosigkeit, Reizbarkeit, Hyperästhesie (erhöhte Hautempfindlichkeit), Übelkeit, Erbrechen, Magen-Darm-Schmerzen (Magenkrämpfe), Muskelkrämpfe (plötzliche Anspannung der Muskeln, Körperschmerzen), Dysphorie (schlechte oder unangenehme Laune), Schlafstörungen, Angst, Hyperhidrose (Übermäßiges Schwitzen), Piloerektion (Gänsehaut, Schüttelfrost oder Zittern), Tachykardie (schneller Herzschlag), erhöhter Blutdruck, Gähnen, Fieber. Verhaltensänderungen, einschließlich gewalttätiges Verhalten, Nervosität und Erregung können auch beobachtet werden.

Akute Entzugssymptome treten gelegentlich auf (können bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen).

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn bei Ihnen eines dieser Symptome auftritt.

Sehr häufig: kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen

- Übelkeit

Häufig: kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen

- Schwindel, Kopfschmerzen
- Schneller Herzschlag

- Hoher Blutdruck, niedriger Blutdruck

Unwohlsein (Erbrechen)

Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen

- Tremor
- Langsamer Herzschlag
- Schwitzen

- Unregelmäßiger Herzschlag
- Durchfall

- Mundtrockenheit
- Schnelle Atmung

- Sehr selten: kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen

- Allergische Reaktionen wie Schwellung von Gesicht, Mund, Lippen oder Rachen, allergischer Schock
- Lebensdrohlicher, unregelmäßiger Herzschlag, Herzinfarkt

- Ansammlung von Flüssigkeit in der Lunge
- Hautprobleme wie Juckreiz, Hautausschlag, Rötung, Schwellung, stark schuppende oder sich abschälende Haut

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt der zuständigen Behörde anzeigen:

Deutschland

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: <http://www.bfarm.de>

Österreich

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 Wien
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Nyxoid aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und auf der Blisterpackung nach „Verwendbar bis“ bzw. „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht einfrieren.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Nyxoid enthält

- Der Wirkstoff ist Naloxon. Jedes Nasenspray enthält 1,8 mg Naloxon (als Hydrochlorid-Dihydrat).
- Die anderen Bestandteile sind Natriumcitrat (Ph.Eur.) (E331), Natriumchlorid, Salzsäure (E507), Natriumhydroxid (E524) und gereinigtes Wasser (siehe „Nyxoid enthält Natrium“ in Abschnitt 2).

Wie Nyxoid aussieht und Inhalt der Packung

Dieses Arzneimittel enthält Naloxon in 0,1 ml einer klaren, farblos bis blässgelben Lösung in einem vorbefüllten Nasenspray, Lösung im Einzeldosbehältnis (Nasenspray, Lösung). Eine Faltschachtel Nyxoid enthält 2 Nasensprays, einzeln eingesiegelt in Blisterpackungen. Jedes Nasenspray enthält eine Einzeldosis Naloxon.

Pharmazeutischer Unternehmer

Mundipharma Corporation (Ireland) Limited
United Drug House Magna Drive
Magna Business Park
Citywest Road
Dublin 24
Irland

Hersteller

Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16
3832 RC Leusden
Niederlande

Deutschland

Mundipharma GmbH
Tel.: +49 (0)69 506029-000
info@mundipharma.de
Österreich
Mundipharma Gesellschaft m.b.H.
Tel: +43 (0) 523 25 05-0
info@mundipharma.at

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 02/2023.

Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internetseiten der Europäischen Arzneimittel-Agentur <http://www.ema.europa.eu> verfügbar.

Advertencias y precauciones

Nyloid solo se le proporcionará después de que usted o su cuidador hayan recibido formación sobre cómo usarlo.

Se debe administrar inmediatamente y no sustituye a la atención médica de urgencia.

Debe llamar al servicio de urgencias si se sospecha una sobredosis por opioides.

Los signos y síntomas de una sobredosis por opioides pueden volver a aparecer después de administrar este pulverizador nasal. Si esto sucede, se pueden administrar otras dosis después de 2 a 3 minutos, utilizando un nuevo pulverizador nasal. Después de recibir este medicamento, el paciente debe permanecer bajo una estrecha supervisión hasta que llegue la ayuda de urgencia.

Prospecto: información para el usuario

Nyxoid 1,8 mg solución para pulverización nasal en envase unidosis

naloxona

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.

- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

- Qué es Nyxoid y para qué se utiliza

- Conseve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.

- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Otros medicamentos y Nyxoid

1. Qué es Nyxoid y para qué se utiliza

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Este medicamento contiene el principio activo naloxona. La naloxona revierte temporalmente los efectos de opioides como la heroína, metadona, fentanilo, oxicodeona, buprenorfina y morfina.

Nyxoid es una solución para pulverización nasal que se utiliza para el tratamiento de urgencia de la sobredosis, o posible sobredosis, por opioides en adultos y adolescentes de 14 años de edad en adelante. Los signos de sobredosis incluyen:

- problemas para respirar
- somnolencia extrema
- no responder a un ruido fuerte o al tacto

Si usted está en riesgo de sobredosis por opioides, debe llevar siempre consigo Nyxoid.

Nyxoid funciona solo temporalmente para revertir los efectos de los opioides mientras espera atención médica de urgencia. No es un sustituto de la atención médica de urgencia.

Nyxoid debe ser usado por personas con la preparación adecuada. Informe siempre a sus amigos y familiares de que lleva Nyxoid con usted.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Nyxoid

No use Nyxoid

Si es alérgico a naloxona o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Nyloid solo se le proporcionará después de que usted o su cuidador hayan recibido formación sobre cómo usarlo.

Se debe administrar inmediatamente y no sustituye a la atención médica de urgencia.

• Debe llamar al servicio de urgencias si se sospecha una sobredosis por opioides.

Los signos y síntomas de una sobredosis por opioides pueden volver a aparecer después de administrar este pulverizador nasal.

Si esto sucede, se pueden administrar otras dosis después de 2 a 3 minutos, utilizando un nuevo pulverizador nasal. Después de recibir este medicamento, el paciente debe permanecer bajo una estrecha supervisión hasta que llegue la ayuda de urgencia.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren. Con este medicamento pueden tener lugar los efectos adversos que siguen.

Problemas médicos a los que se debe prestar atención

Si tiene dependencia física a los opioides o ha recibido dosis altas de opioides (por ejemplo, heroína, metadona, fentanilo, oxicodeona, buprenorfina o morfina). Puede experimentar fuertes síntomas de abstinencia con este medicamento (ver más adelante en la sección 4 de este prospecto, bajo "Problemas médicos a los que se debe prestar atención").

- Si toma opioides para controlar el dolor. El dolor puede aumentar cuando reciba Nyxoid.

- Si utiliza buprenorfina. Puede que Nyxoid no revierta completamente los problemas respiratorios.

3. Cómo usar Nyxoid

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico, farmacéutico o enfermero.

Se proporcionará formación sobre cómo usar Nyxoid antes de que se le suministre. A continuación proporcionamos una guía paso a paso.

Instrucciones para administrar Nyxoid solución para pulverización nasal

1. Compruebe los síntomas y la respuesta.

- **Compruebe si hay respuesta para ver si la persona está consciente.** Puede gritar su nombre, agitarle los hombros suavemente, hablarle alto al oído, frotarle el esternón, pellizcarle la oreja o la base de una uña.

- **Compruebe las vías respiratorias y la respiración.** Libere la boca o la nariz de cualquier bloqueo. Compruebe la respiración durante 10 segundos. ¿Se mueve el pecho? ¿Puede oír sonidos de respiración? ¿Puede sentir la respiración en la mejilla?

- **Compruebe los signos de sobredosis,** como: sin respuesta al tacto o el sonido, respiración lenta e irregular o ausencia de respiración, ronquidos, jadeos o respiraciones rápidas, uñas o labios morados o azules.


2. Si se sospecha que hay sobredosis, se debe administrar Nyxoid

2



Llame a una ambulancia.

3




Despegue la parte posterior del blister por una esquina para sacar el pulverizador nasal del envase.

4



Coloque al paciente boca arriba. Sujete el cuello por la parte posterior permitiendo que la cabeza se incline hacia atrás. Despeje cualquier cosa que pueda bloquear la nariz.

5



Sujete la parte inferior del émbolo del pulverizador nasal con el dedo pulgar y coloque los dedos índice y corazón a ambos lados de la boquilla.


No cebe ni pruebe el dispositivo antes de su uso ya que contiene solo una dosis y no se puede volver a utilizar.

Nyxoid contiene sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis; esto es, esencialmente "exento de sodio".

Informe siempre a sus amigos y familiares de que lleva Nyxoid con usted.

6



Noce la boquilla del dispositivo en una de las fosas nasales. Presione con firmeza el émbolo hasta que haga clic para administrar la dosis. Retire la boquilla del pulverizador nasal de la fosa nasal después de administrar la dosis.