

## Gebrauchsinformation

**Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Chelidonium Rh D4 jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder die Beschwerden länger anhalten, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

### Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Chelidonium Rh D4 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Chelidonium Rh D4 beachten?
3. Wie ist Chelidonium Rh D4 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

# Chelidonium Rh D4

## Augentropfen



WELEDA

### 1. Was ist Chelidonium Rh D4 und wofür wird es angewendet?

Chelidonium Rh D4 ist ein anthroposophisches Arzneimittel zur Anregung der Tränensekretion.

### Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehört zu den Anwendungsgebieten die Anregung der Tränensekretion bei trockener Bindehaut und trockener Bindehautentzündung.

### 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Chelidonium Rh D4 beachten?

#### Gegenanzeigen

Keine bekannt

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Vor der Anwendung des Arzneimittels sollte eine Untersuchung durch einen Augenarzt erfolgen. Bei einem Nachlassen des Sehvermögens sowie bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden muss ebenfalls ein Arzt aufgesucht werden.

#### Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Bei Kindern unter 12 Jahren sollen Chelidonium Rh D4 Augentropfen nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Wie alle Arzneimittel sollte Chelidonium Rh D4 in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### 3. Wie ist Chelidonium Rh D4 anzuwenden?

Wenden Sie Chelidonium Rh D4 immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an.

#### Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

3 mal täglich 1 Tropfen in den Bindehautsack träufeln.

Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise am Ende dieser Packungsbeilage.

#### Dauer der Anwendung

Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie die Anwendung von *Chelidonium Rh D4* vergessen haben:

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Selten tritt nach dem Einträufeln im Auge ein vorübergehendes Brennen auf.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Verwenden Sie die Augentropfen nach dem ersten Öffnen nicht länger als 3 Monate. Bitte tragen Sie das Datum in das dafür vorgesehene Feld auf dem Etikett und der Faltschachtel ein.

#### Für Kontaktlinsenträger

*Chelidonium Rh D4* Augentropfen sind mit Kontaktlinsen verträglich. Von manchen Herstellern wird allerdings empfohlen, die Linsen vor der Applikation von Augentropfen generell herauszunehmen und erst nach ca. 30 Minuten wieder einzusetzen. Dieser Empfehlung, die mit bestimmtem Linsenmaterial zusammenhängen kann, sollte man dann Folge leisten.

#### Zusammensetzung

10,2 g (= 10 ml) enthalten: Wirkstoff: *Chelidonium Rh Dil. D4* 10 g.

Sonstige Bestandteile: Borsäure, Natriumtetraborat.

Mit Kaliumnitrat isotonisiert.

#### Darreichungsform und Packungsgröße

10 ml Augentropfen

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** August 2017

#### Anwendungshinweise

1. Entfernen Sie die kleine Schutzkappe durch leichtes Ziehen von der Flaschenspitze.
2. Legen Sie den Daumen auf die grüne Dosierkappe und unterstützen Sie die Flasche mit den Fingern.
3. Drehen Sie die Flasche und pumpen Sie vor der ersten Anwendung mehrmals, bis der erste Tropfen austritt. Die Flasche ist nun einsatzbereit: durch vorsichtiges Drücken der Dosierkappe ermöglichen Sie den Austritt der Tropfen.
4. Neigen Sie den Kopf nach hinten, ziehen Sie das Unterlid nach unten und träufeln Sie den Tropfen in den Bindehautsack. Bewegen Sie anschließend das geschlossene Auge kurz hin und her.
5. Verschließen Sie die Flaschenspitze sofort wieder mit der Schutzkappe.

