



**7**

**Colchicum  
Komplex**

Homöopathisches  
Arzneimittel

**Mischung zum Einnehmen**  
**Zusammensetzung:**  
 10 g (= 10,78 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Colchicum D4 Dil., Chamomilla D6 Dil., Colocynthis D6 Dil. je 3,3333 g  
 Dieses Präparat enthält 50,0 Vol.-% Alkohol. Packungsbeilage beachten!  
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.  
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!  
 Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren  
 Reg.-Nr.: 2513033.00.00 Inhalt: 50 ml  
**Ch.-B.: 0000** **Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation**  
**7 Colchicum Komplex**  
 Homöopathisches Arzneimittel  
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml  
 1 g entspricht 20 Tropfen

**Anwendungsgebiete:**  
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.  
 Hinweise: siehe Rückseite.

**Gegenanzeigen:**  
 Wann dürfen Sie 7 Colchicum Komplex nicht einnehmen?  
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 7 Colchicum Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.  
 7 Colchicum Komplex enthält Chamomilla recutita und

sollte daher bei Überempfindlichkeit gegen Kamille oder gegen und andere Korbblütler nicht angewandt werden.  
 Wann dürfen Sie 7 Colchicum Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?  
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 7 Colchicum Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?  
 Während der Schwangerschaft und Stillzeit ist 7 Colchicum Komplex nicht anzuwenden.  
**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**  
 Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 50,0 Vol.-% Alkohol.  
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,32 g Alkohol zugeführt.  
 Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder.  
 Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.  
 Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:  
 Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.  
**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**  
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**  
 Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.  
 Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.  
**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite  
**Nebenwirkungen:** Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.  
**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**  
 siehe Rückseite  
**Stand der Information:** Dezember 2018