



33

**Juniperus
Komplex**

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
 10 g (= 11,00 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Helleborus niger D4 Dil., Acidum aceticum D3 Dil., Adonis vernalis D2 Dil., Apocynum D4 Dil., Asclepias tuberosa D3 Dil., Asparagus off. D2 Dil., Millefolium D2 Dil., Acidum benzoicum e resina D3 Dil., Juniperus communis D2 Dil., Crataegus Ø je 1 g. Dieses Präparat enthält 59,6 Vol.-% Alkohol. Packungsbeilage beachten!
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
 Reg.-Nr.: 2513031.00.00 Apothekenpflichtig Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
33 Juniperus Komplex
 Homöopathisches Arzneimittel
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
 1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
 Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
 Wann dürfen Sie 33 Juniperus Komplex nicht einnehmen?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 33 Juniperus Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

33 Juniperus Komplex enthält Achillea millefolium. 33 Juniperus Komplex sollte daher bei Überempfindlichkeit gegen Schafgarbe oder gegen andere Korbblütler nicht angewandt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft beachten?
 33 Juniperus Komplex soll in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 33 Juniperus Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 33 Juniperus Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Warnhinweis:
 Dieses Arzneimittel enthält 59,6 Vol.-% Alkohol. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,35 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
 Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
 Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite

Stand der Information: April 2016