



141

Ruta

Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

Zusammensetzung: 10 g (= 11,03 ml) Mischung enthalten:
Arzneilich wirksame Bestandteile: Ruta D2 Dil., Ranunculus
bulbosus D3 Dil., Aconitum D4 Dil., Actaea D3 Dil., Bryonia D3 Dil.,
Gelsemium D4 Dil., Pulsatilla D4 Dil., Rhododendron D4 Dil., Viola
odorata (HAB 1934) D2 Dil. (HAB, Vorschr. 3a), Sulfur D6 Dil.,
Petroleum rectificatum D4 Dil., Pinus sylvestris D2 Dil., Ammonium
phosphoricum (HAB 1934) D4 Dil. [HAB, Vorschr. 5a, D1 mit
gereinigtem Wasser] je 0,7692 g. Dieses Präparat enthält 60,1
Vol.-% Alkohol. Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer
therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden
Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren.

Reg.-Nr.: 2512448.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

141 Ruta Komplex

Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher
ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 141 Ruta Komplex nicht einnehmen?
Wegen des Alkoholgehaltes soll 141 Ruta Komplex bei
Alkoholkranken nicht angewendet werden.
141 Ruta Komplex darf bei Säuglingen und

Kleinkindern bis zum 6. Lebensjahr nicht angewendet
werden.

Wann dürfen Sie 141 Ruta Komplex erst nach
Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 141 Ruta Komplex bei
Leberkranken, Epileptikern und Personen mit
organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach
Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit
beachten?

Während der Schwangerschaft und Stillzeit ist 141
Ruta Komplex nicht anzuwenden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und

Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 60,1 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der
Dosierungsanleitung werden bis zu 0,35 g Alkohol
zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei
Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,
Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für
Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer
Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es
soll deshalb bei Kindern zwischen 6 und 12 Jahren
nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen
vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit
einem Teelöffel Wasser einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit
der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des

Arzneimittels: siehe Rückseite

Stand der Information: November 2017