

# Dermapharm AG

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

## Chinosol® Tabletten 1,0 g

Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Chinosol Tabletten 1,0 g jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

- 1. Was sind Chinosol Tabletten 1,0 g und wofür werden sie angewendet?**
- 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Chinosol Tabletten 1,0 g beachten?**
- 3. Wie sind Chinosol Tabletten 1,0 g anzuwenden?**
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**
- 5. Wie sind Chinosol Tabletten 1,0 g aufzubewahren?**
- 6. Weitere Informationen**

### 1. WAS SIND CHINOSOL TABLETTEN 1,0 G UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Chinosol Tabletten 1,0 g sind ein keimminderndes Mittel zur Anwendung auf der Haut.

Chinosol Tabletten 1,0 g werden angewendet zur äußerlichen Anwendung zur Keimminderung auf der Haut. Zum Bereiten von Bädern, Spülungen und Umschlägen.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON CHINOSOL TABLETTEN 1,0 G BEACHTEN?

Die zubereitete Lösung färbt die Haut, Wäsche und andere Gegenstände schwach gelb. Frische Flecken lassen sich aus der Wäsche durch einfaches Waschen leicht entfernen. Nach Eintrocknung kann die Fleckentfernung mit verdünnter Essigsäure versucht werden. Bei empfindlichen Textilien sollte zunächst an einer geeigneten Stelle geprüft werden, wie das Material die Behandlung verträgt.

**Chinosol Tabletten 1,0 g dürfen nicht angewendet werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat, anderen Chinolinen oder einem der sonstigen Bestandteile von Chinosol Tabletten 1,0 g sind
- wenn Sie schwanger sind oder stillen.

**Bei Anwendung von Chinosol Tabletten 1,0 g mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/ angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Sie dürfen Chinosol Tabletten 1,0 g nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen, da über die Sicherheit einer Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit keine Daten vorliegen.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

### 3. WIE SIND CHINOSOL TABLETTEN 1,0 G ANZUWENDEN?

Wenden Sie Chinosol Tabletten 1,0 g immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

**Art der Anwendung**

Zur äußerlichen Anwendung nach Lösen der Tablette in Wasser. Zum Bereiten von Bädern, feuchten Verbänden, Umschlägen und Spülungen.

Die Tablette löst sich nicht rückstandsfrei auf. Die zubereitete Lösung kann angewendet werden, sobald die Tablette vollständig zerfallen ist (kann einige Minuten dauern).

Soweit möglich, ist warmes Wasser zu verwenden.

Bäder:

1 Tablette zu 1,0 g auf 3 - 4 Liter Wasser

Feuchte Verbände, Umschläge und Spülungen:

1 Tablette zu 1,0 g auf 2 - 3 Liter Wasser

**Hinweis:**

Die Zerfallszeit der Tablette kann beschleunigt werden, indem warmes bis heißes, aber nicht kochendes Wasser (ca. 50 - 80 °C) verwendet wird. Wir empfehlen in diesem Fall, einen Teil der benötigten Wassermenge zu erhitzen und zum Lösen der Tablette zu verwenden und diese Lösung mit der entsprechenden Restmenge an kaltem oder lauwarmem Wasser zu verdünnen, so dass die fertige Lösung sofort die für die vorgesehene Anwendung gewünschte Temperatur hat. Erst wenn die fertige Lösung nicht mehr als 40 °C warm ist, anwenden.

**Dauer der Anwendung**

Wenden Sie Chinosol Tabletten 1,0 g ohne ärztlichen Rat nicht länger als 14 Tage an.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Chinosol Tabletten 1,0 g zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge von Chinosol Tabletten 1,0 g angewendet haben, als Sie sollten**

Sie können die Behandlung mit der angegebenen Dosierung fortsetzen. Bei einer kurzfristigen Überdosierung sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

**Wenn Sie die Anwendung von Chinosol Tabletten 1,0 g vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

**Wenn Sie die Anwendung von Chinosol Tabletten 1,0 g abbrechen**

Sie könnten den Behandlungserfolg gefährden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie die Behandlung mit Chinosol Tabletten 1,0 g abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel können Chinosol Tabletten 1,0 g Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

|               |  |
|---------------|--|
| Sehr häufig   | mehr als 1 Behandler von 10                                      |
| Häufig        | 1 bis 10 Behandelte von 100                                      |
| Gelegentlich  | 1 bis 10 Behandelte von 1.000                                    |
| Selten        | 1 bis 10 Behandelte von 10.000                                   |
| Sehr selten   | weniger als 1 Behandler von 10.000                               |
| Nicht bekannt | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar |

**Mögliche Nebenwirkungen**

Häufig kommt es bei der Anwendung zu örtlichen Hautirritationen (Kontaktexzemen).

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. WIE SIND CHINOSOL TABLETTEN 1,0 G AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Packung nach «Verwendbar bis» angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Zubereitung**

Die chemische und physikalische Stabilität der gebrauchsfertigen Zubereitung wurde bei Raumtemperatur über 28 Tage nachgewiesen. Aus mikrobiologischer Sicht empfehlen wir Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit, die gebrauchsfertige Zubereitung dennoch möglichst sofort (innerhalb eines Tages) zu verwenden.

**6. WEITERE INFORMATIONEN****Was Chinosol Tabletten 1,0 g enthalten**

Der Wirkstoff ist Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat.

1 Tablette enthält 952 mg Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Talkum, Macrogol 6000, hochdisperses Siliciumdioxid.

**Wie Chinosol Tabletten 1,0 g aussehen und Inhalt der Packung**

Chinosol Tabletten 1,0 g sind gelbe Tabletten und sind in Packungen zu 5, 10, 20 und 50 Tabletten erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer****Dermapharm AG**

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Tel.: 089 / 641 86-0

Fax: 089 / 641 86-130

**Hersteller**

**mibe** GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2015.**

