

## **Gebrauchsinformation – bitte aufmerksam lesen**

### **Antimonium tartaricum C30**

Homöopathisches Arzneimittel  
Wirkstoff: Tartarus stibiatus C30  
Streukügelchen

zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Antimonium tartaricum C30 jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Antimonium tartaricum C30 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Antimonium tartaricum C30 beachten?
3. Wie ist Antimonium tartaricum C30 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Antimonium tartaricum C30 aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. WAS IST ANTIMONIUM TARTARICUM C30 UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Antimonium tartaricum C30 ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

#### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ANTIMONIUM TARTARICUM C30 BEACHTEN?**

**Antimonium tartaricum C30 darf nicht angewendet werden**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem arzneilich wirksamen oder dem sonstigen Bestandteil von Antimonium tartaricum C30 sind.

### **Kinder**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Bei Anwendung von Antimonium tartaricum C30 mit anderen Arzneimitteln:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Antimonium tartaricum C30:**

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie Antimonium tartaricum C30 daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierung hat Antimonium tartaricum C30 keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

## **3. WIE IST ANTIMONIUM TARTARICUM C30 EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Antimonium tartaricum C30 immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Antimonium tartaricum C30 sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anderes verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich je 5 Streukügelchen ein.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3 mal täglich jeweils 5 Streukügelchen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Die Streukügelchen im Mund zergehen lassen. Die Einnahme kann unabhängig von den Mahlzeiten erfolgen.

### **Wie lange sollten Sie Antimonium tartaricum C30 einnehmen?**

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Halten Sie sich auch dann an die Anwendungsvorschriften, wenn Sie sich bereits nach kürzerer Zeit besser fühlen. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge Antimonium tartaricum C30 eingenommen haben, als Sie sollten**

Von dem homöopathischen Bestandteil sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Bei der Einnahme von Antimonium tartaricum C30 sind bisher keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. WIE IST ANTIMONIUM TARTARICUM C30 AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung).

**Aufbewahrungsbedingungen:**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

**6. WEITERE INFORMATIONEN****Was Antimonium tartaricum C30 enthält:**

10 g Streukügelchen enthalten an Wirkstoff:  
Streukügelchen Tartarus stibiatus C30 10 g

Hinweis für Diabetiker: 1 Dosis von 10 Globuli enthält 0,007 Broteinheiten (BE).

**Wie Antimonium tartaricum C30 aussieht und Inhalt der Packung:**

Flasche mit 15 g Streukügelchen (Globuli)

apothekenpflichtig

Reg.-Nr. 1915.55.52

**Pharmazeutischer Unternehmer****Alhopharm Arzneimittel GmbH**

Alte Chaussee 2 • 35614 Aßlar-Werdorf

**Herstellung und Vertrieb:**

Hauptstraße 49 • 35614 Aßlar-Werdorf

Tel. 06443 – 69005-13 • Fax 06443 – 69005-10

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im März 2022 überarbeitet.