



Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zerosorin® Tabletten

Reg.-Nr. 50883.00.00

Homöopathisches Arzneimittel

Indikationsgruppe:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei während der Anwendung dieses Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Laktose ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glycose-Galactose-Malabsorption leiden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung, Dauer der Anwendung:

Wie viel, wie oft und wie sollten Sie Zerosorin Tabletten anwenden?

Soweit nicht anders verordnet: Erwachsene und Kinder über 12 Jahren nehmen bei akuten Zuständen zur häufigen Anwendung alle halbe bis ganze Stunde je 1 Tablette (höchstens 12-mal täglich), bei chronischen Verlaufsformen 1-3-mal täglich 1 Tablette ein.

Wie lange sollten Sie Zerosorin Tabletten anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden. Die Akutdosierung ist in der Regel nicht länger als einige Tage (maximal 1 Woche) anzuwenden.

bitte wenden!

Hinweise für den Fall der Überdosierung, der unterlassenen Einnahme oder Hinweise auf die Gefahr von unerwünschten Folgen des Absetzens:

Bei unterlassener Einnahme oder Absetzen von Zerosorin Tabletten ergeben sich keine unerwünschten Folgen.

Was ist zu tun, wenn Zerosorin Tabletten in zu großen Mengen angewendet wurde (Überdosierung)?

Bei der Einnahme größerer Mengen (über 80 Tabletten auf einmal) des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Laktoseintoleranz) zu Magen - Darm - Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Bei Fragen zur Klärung der Anwendung ist der Arzt oder Apotheker zu befragen.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Zerosorin Tabletten soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält: Wirkstoffe: 15 mg Anamirta cocculus Trit.D4, 15 mg Conium maculatum Trit.D4, 15 mg Gelsemium sempervirens Trit.D5, 5 mg Zincum metallicum Trit.D7; sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Laktose-Monohydrat.

Darreichungsform und Inhalt:

80 (N1), 300 (N2) Tabletten zum Einnehmen.

Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:

SCHUCK GmbH, Industriestr. 11, 90571 Schwaig, Tel. 0911/500185, Fax 0911/508802, E-Mail: info@schuck-arzneimittel.de, www.schuck-arzneimittel.de

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht über 25° C lagern!

Datum und Fassung der Packungsbeilage: August 2008