

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Belladonna Pentarkan® H



Mischung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach Anwendung dieses Arzneimittels nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Belladonna Pentarkan® H und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Belladonna Pentarkan® H beachten?
3. Wie ist Belladonna Pentarkan® H anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Belladonna Pentarkan® H aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Belladonna Pentarkan® H und wofür wird es angewendet?

Belladonna Pentarkan® H ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei entzündlichen Erkrankungen.

Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Fieberhafte Entzündungen z. B. der Mandeln.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Belladonna Pentarkan® H beachten?

Belladonna Pentarkan® H darf nicht angewendet werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Bienengift oder einen der sonstigen Bestandteile von Belladonna Pentarkan® H sind.
- bei Alkoholkranken.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Belladonna Pentarkan® H ist erforderlich:

Bei starker Entzündung oder Eiterung der Mandeln sowie bei Fieber, das länger als drei Tage anhält oder 39 Grad übersteigt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wegen des Alkoholgehaltes sollte Belladonna Pentarkan® H bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Anwendung von Belladonna Pentarkan® H mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

Bei Anwendung von Belladonna Pentarkan® H zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte Belladonna Pentarkan® H nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Belladonna Pentarkan® H

Enthält 56 Vol.-% Alkohol.

3. Wie ist Belladonna Pentarkan® H anzuwenden?

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Beschwerden sollten Sie halbstündlich bis stündlich je 5 Tropfen (höchstens 6-mal täglich) einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende häufige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

In chronischen Fällen sollten Sie 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Hinweis: Für die korrekte Dosierung Flasche zum Tropfen senkrecht halten.

Die Tropfen sollten unabhängig von den Mahlzeiten, z. B. mindestens eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen, eingenommen werden. Sie sollten die Tropfen vorzugsweise vor dem Schlucken einige Zeit im Mund behalten.

Bei Bedarf können die Tropfen vor der Einnahme in etwas Wasser verdünnt werden.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge Belladonna Pentarkan® H angewendet haben, als Sie sollten

Es sind bisher keine schädlichen Wirkungen von Überdosierungen bekannt. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt halten.

Wenn Sie die Anwendung von Belladonna Pentarkan® H vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Belladonna Pentarkan® H abbrechen

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung von Belladonna Pentarkan® H abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Belladonna Pentarkan® H Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nach Anwendung kann verstärkt Speichelfluss und in seltenen Fällen Kreislaufschwäche auftreten. Außerdem können aufgrund des Bestandteiles Mercurius cyanatus (Quecksilber) gelegentlich allergische Reaktionen auftreten. Das Präparat ist dann abzusetzen.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Belladonna Pentarkan® H aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Belladonna Pentarkan® H enthält

Die Wirkstoffe sind: Belladonna Dil. D3 1,0 g, Apis mellifica Dil. D2 1,0 g, Phytolacca Dil. D4 1,0 g, Mercurius cyanatus Dil. D8 1,0 g, Ailanthus glandulosa Dil. D1 1,0 g
in 10 g (entsprechend 10,9 ml) Mischung.

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol 96 %, Gereinigtes Wasser.

1 ml entspricht 33 Tropfen.

Wie Belladonna Pentarkan® H aussieht und Inhalt der Packung

Belladonna Pentarkan® H ist eine gelbe Flüssigkeit zum Einnehmen.

Packung mit 50 ml Mischung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe
info@dhu.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2015.

Belladonna Pentarkan® H enthält 5 Einzelbestandteile, die sich in ihrer Wirkung bei akuten fieberhaften Entzündungen und Infekten ergänzen. Entzündungszeichen wie Rötung, Schwellung, Schmerzen (insbesondere der Rachenschleimhaut) und Fieber werden positiv beeinflusst. Insgesamt eignet sich das Präparat deshalb gut zur Behandlung von Rachen- und Mandelentzündungen mit den typischen Beschwerden wie Anschwellung der Mandeln und Lymphknoten, Halsschmerzen und Fieber.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6568278.00.00