

Imidin® o.K. Nasenspray 0,1% ohne Konservierungsstoffe (Ap)

Wirkstoff: Xylometazolinhydrochlorid Zus.: 1ml Lösung enthält: 1 mg Xylometazolinhydrochlorid, ein Sprühstoß mit 0,09 ml Lösung enthält 0,09 mg Xylometazolinhydrochlorid.

Sonst. Bestandt.: Citronensäure-Monohydrat, Natriumcitrat (Ph. Eur.), Glycerol 85 %, Gereinigtes Wasser.

Anw.: Kdr. ab 6 J. und Erwachs.: Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen, anfallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), allergischem Schnupfen (Rhinitis allergica).

Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile, Rhinitis sicca, Zustand nach transspenoidaler Hypophysektomie oder anderen operativen Eingriffen, die die Dura Mater freilegen, Kleinkinder unter 6 Jahren.

Schwangers./Stillzeit: Sorgfältige Nutzen/Risiko-Abwägung.

Nebenwirk.: Häufig: Brennen und Trockenheit der Nasenschleimhaut, Niesen. Gelegentlich: Nach Abklingen der Wirkung verstärkte Schleimhautschwellung, Nasenbluten, Überempfindlichkeitsreaktionen (Angioödem, Hautausschlag, Juckreiz).

Selten: Herzklopfen, Tachykardie, Hypertonie.

Sehr selten: Unruhe, Schlaflosigkeit, Müdigkeit (Schläfrigkeit, Sedierung), Kopfschmerzen, Halluzinationen (vorrangig bei Kindern), Arrhythmien, Apnoe bei jungen Säuglingen und Neugeborenen. (Stand Juli 2014).

Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlin.