



Gebrauchsinformation

## **Caelo Myrrhentinktur**

Tinktur zur lokalen Anwendung im Mund- und Rachenraum

### **Zusammensetzung:**

100 g Caelo Myrrhentinktur enthalten: 100 g Tinktur aus Myrrhe (1:5 [Verhältnis Droge zu Auszugsmittel]); Auszugsmittel: Ethanol 90% (V/V)

### **Darreichungsform und Inhalt:**

50 ml Tinktur

### **Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Pflanzliches Arzneimittel bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum.

### **Anwendungsgebiete:**

Lokale Behandlung leichter Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

### **Hinweis:**

Sollten die Beschwerden länger als eine Woche andauern, wiederkehren oder unklare Beschwerden auftreten, ist ein Arzt aufzusuchen.

### **Gegenanzeigen:**

Myrrhentinktur ist von Alkoholkranken nicht anzuwenden.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

Zur Anwendung von Myrrhentinktur in Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Myrrhentinktur soll daher von diesem Personenkreis nicht angewendet werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Keine bekannt.

### **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, werden die betroffenen Schleimhautstellen 2-3 mal täglich mit der Tinktur betupft bzw. es werden zum Gurgeln oder Spülen 5 bis 10 Tropfen Tinktur in ein Glas Wasser gegeben.

### **Hinweise für den Fall von Anwendungsfehlern oder Überdosierung:**

Eine Einnahme von größeren Mengen Myrrhentinktur kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen. In diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhalts werden 35,5 g Alkohol aufgenommen.

**Nebenwirkungen:**

Bei unverdünnter Anwendung der Tinktur können vorübergehend ein leichtes Brennen und eine Geschmacksirritation auftreten.

**Hinweis:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweise:**

Dicht verschlossen, vor Licht geschützt aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

**Stand der Information: Januar 2015****Pharmazeutisches Unternehmen:****Caesar & Loretz GmbH**

Herderstraße 31

D-40721 Hilden

Mail: [info@caelo.de](mailto:info@caelo.de) · [www.caelo.de](http://www.caelo.de)