

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **YOCON-GLENWOOD® Tabletten 5 mg**

Wirkstoff: Yohimbinhydrochlorid

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg beachten?
3. Wie ist YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg und wofür wird es angewendet?**

YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg ist ein Alpha<sub>2</sub>-Rezeptorenblocker.

YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg wird angewendet bei:

Unterstützender Behandlung der leichten bis mittelschweren erektilen Dysfunktion im Rahmen weiterer therapeutischer Maßnahmen gegen Impotenz.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg beachten?**

**YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Yohimbinhydrochlorid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- wenn Sie unter einer Herzerkrankung leiden;
- wenn Sie Bluthochdruck oder niedrigen Blutdruck haben;
- bei stark eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion;
- wenn Sie unter Magen- oder Darmgeschwüren leiden;
- bei einem erhöhten Augeninnendruck (Glaukom);
- wenn Sie an psychiatrischen Erkrankungen, insbesondere Stimmungsstörungen oder Angstzuständen leiden;
- wenn Sie bestimmte Arzneimittel gegen psychiatrische oder neurologische Erkrankungen oder Bluthochdruck einnehmen oder Alkohol trinken.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg einnehmen.

Die Einnahme von YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg kann eine bestehende Niereninsuffizienz verschlimmern. Bei bekannter Fallsucht (Epilepsie) kann YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg die Häufigkeit des Auftretens von Krampfanfällen erhöhen.

### **Einnahme von YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Die Wirkung nachfolgend genannter Arzneistoffe bzw. Präparategruppen kann bei gleichzeitiger Behandlung mit YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg beeinflusst werden:

YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg sollte nicht zusammen mit Clonidin-Präparaten eingenommen werden, da sich die Wirkungen von Yohimbinhydrochlorid und Clonidin gegenseitig aufheben.

YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg kann die Wirkung von anderen Bluthochdruck senkenden Mitteln vermindern.

Bei der gleichzeitigen Einnahme von YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg und antidepressiv oder antipsychotisch wirkenden Arzneimitteln wird deren Wirkung bzw. Nebenwirkungen möglicherweise verstärkt.

Yohimbinhydrochlorid kann die Wirkung von Alprazolam bei gesunden Probanden vermindern.

Von einer gleichzeitigen Einnahme von Amphetaminen (Aufputschmitteln) zusammen mit YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg wird aufgrund einer möglichen Wirkungsverstärkung dringend abgeraten.

Patienten mit vorhandenen Risikofaktoren im Herz-Kreislauf-Bereich sollten eine gleichzeitige Einnahme von Medikamenten mit dem Wirkstoff Sibutramin (Appetitzügler) vermeiden.

YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg können zu einer Wirkungssteigerung von Opiaten führen.

Wechselwirkungen mit Phenothiazin sind möglich.

### **Einnahme von YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg zusammen mit Alkohol**

Während der Anwendung von YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg dürfen Sie keinen Alkohol trinken.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg ist für die Behandlung von Frauen nicht vorgesehen.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

## **3. Wie ist YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt für Erwachsene 1 – 2 Tabletten bis zu 3 x täglich, was einer maximalen Tagesdosis von 6 Tabletten (entsprechend 30 mg Yohimbinhydrochlorid) entspricht. Es wird empfohlen, die Therapie mit 2 x 1 Tablette pro Tag zu beginnen und die Dosis bei Bedarf schrittweise zu erhöhen.

### **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg ist nicht für die Behandlung von Patienten unter 18 Jahren angezeigt.

YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg sollte jeweils nach den Mahlzeiten mit einem Glas Wasser (200 ml) eingenommen werden.

Die Behandlungsdauer richtet sich nach der Schwere des Krankheitsbildes. Sie erstreckt sich üblicherweise auf einen Zeitraum von ca. 8 Wochen. Im Allgemeinen ist mit einer Latenz von 2 – 3 Wochen ab Beginn der Einnahme bis zum Wirkungseintritt zu rechnen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg zu stark oder zu schwach ist.

### **Wenn Sie eine größere Menge YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg eingenommen haben, als Sie sollten**

Achten Sie auf folgende Symptome, eine Überdosierung ist gekennzeichnet durch: Übelkeit, Oberbauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Kribbeln, Schüttelfrost, Hitzewallungen, Angstzustände, Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit, Koordinationsstörungen, epilepsieartige Krämpfe, Bewusstlosigkeit, Benommenheit (Somnolenz), erhöhter oder niedriger Blutdruck, Herzrasen, Schmerzen im Brustbereich, rückläufiger Gedächtnisverlust, vegetative Beschwerden, Blauotfärbung der Haut bzw. Schleimhaut, Harnverhalt, systemischer Lupus erythematoses. In diesen Fällen kontaktieren Sie so schnell wie möglich einen Arzt.

## Wenn Sie die Einnahme von YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

#### Mögliche Nebenwirkungen

*Häufig:* Schlaflosigkeit, Angst, Unruhe, Rastlosigkeit, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, erhöhte Häufigkeit des Wasserlassens.

*Gelegentlich:* allergische Reaktionen, Steigerung des Blutdrucks und der Herzfrequenz, Herzklopfen, Blutdruckerniedrigung, Nervosität, verminderter Sexualtrieb, Schwindelgefühl, kalte Füße, Kribbeln, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Magenbeschwerden, Durchfall, Verstopfung, Oberbauchschmerzen, Blähungen, Hautrötung, Nesselsucht, vermehrter Haarwuchs, Schwitzen, Schüttelfrost, Fieber, Ermüdung.

*Sehr selten:* Zittern, Krampf der Bronchialmuskulatur (Bronchospasmus), Hautauschlag, schmerzhafte Blasenentleerung (Dysurie), verminderter Harndrang, Schmerzen im Genitalbereich.

*Nicht Bekannt:* starke Verminderung der Granulozyten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte,  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Blisterstreifen und der Faltschachtel nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern.  
In der Originalverpackung aufbewahren.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg enthält**

- Der Wirkstoff ist: Yohimbinhydrochlorid.
- Die sonstigen Bestandteile sind:

Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat, Povidon K 25, mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.)

### **Wie YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg aussieht und Inhalt der Packung**

YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg sind weiße, runde Tabletten mit einer Einkerbung auf einer Seite und dem Eindruck „YOC 5“ auf der anderen.

YOCON-GLENWOOD Tabletten 5 mg ist in Packungen mit 50 und 100 Tabletten erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH  
Ziegelhof 24  
17489 Greifswald  
Telefon: 03834/8539-0  
Telefax: 03834/8539-119

### **Mitvertreiber**

WALTER RITTER GmbH + Co. KG  
Spaldingstr. 110b  
20097 Hamburg  
Telefon: 040/236996-0  
Telefax: 040/236996-33

SANAVITA Pharmaceuticals GmbH  
Spaldingstr. 110b  
20097 Hamburg  
Telefon: 040/7308853-0  
Telefax: 040/7308853-55

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2017.**