



Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Flenin Tabletten

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung dieses Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Gegenanzeigen:

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Laktose ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erblichen Galactose-Unverträglichkeit (Galactose-intoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glycose- Galactose - Malabsorption leiden. Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Warnhinweise: Keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung und Dauer der Anwendung:

Wie viel, wie oft und wie sollten Sie Flenin Tabletten anwenden?

Soweit nicht anders verordnet: Erwachsene und Kinder über 12 Jahren nehmen bei akuten Zuständen zur häufigen Anwendung alle halbe bis ganze Stunde je 1 Tablette (höchstens 12-mal täglich), bei chronischen Verlaufsformen 1-3-mal täglich 1 Tablette ein.

Wie lange sollten Sie Flenin Tabletten anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

bitte wenden!

Die Akutdosierung ist in der Regel nicht länger als einige Tage (maximal 1 Woche) anzuwenden.

Hinweise für den Fall der Überdosierung, der unterlassenen Einnahme oder Hinhinweise auf die Gefahr von unerwünschten Folgen des Absetzens:

Bei unterlassener Einnahme oder Absetzen von Flenin Tabletten ergeben sich keine unerwünschten Folgen.

Bei Fragen zur Klärung der Anwendung ist der Arzt oder Apotheker zu befragen.

Nebenwirkungen:

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Bei Arzneimitteln mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Flenin Tabletten soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält: Wirkstoffe: 0,3 mg Acidum arsenicosum Trit. D3, 0,3 mg Conium maculatum Trit. D2, 0,3 mg Echinacea Trit. D2, 30,0 mg Marsdenia cundurango Trit. D2, 3,2 mg Secale cornutum Trit. D2, 30,0 mg Viscum album Trit. D1; sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Laktose-Monohydrat.

Darreichungsform und Inhalt:

100 (N1), 250 (N2) Tabletten zum Einnehmen.

Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:

SCHUCK GmbH, Industriestr. 11, 90571 Schwaig, Tel. 0911/500185, Fax 0911/508802, E-Mail: info@schuck-arzneimittel.de, www.schuck-arzneimittel.de

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht über 25° C lagern!

Datum und Fassung der Packungsbeilage: März 2008

Reg.-Nr. 54125.00.00