Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Alprazolam AL

0,5 mg Tabletten **1 mg** Tabletten

Alprazolam

Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

• Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals

lesen Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der

- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen
- Beschwerden haben wie Sie. • Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben
- sind. Siehe Abschnitt 4 Was in dieser Packungsbeilage steht schwere Schmerzzustände

angewendet?

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Alprazolam AL beachten?

1. Was ist Alprazolam AL und wofür wird es

- 3. Wie ist Alprazolam AL einzunehmen?
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?5. Wie ist Alprazolam AL aufzubewahren? 6. Inhalt der Packung und weitere
- Informationen
- Was ist Alprazolam AL und wofür wird es angewendet?

Alprazolam AL enthält den Wirkstoff Alprazolam und gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln die "Benzodiazepine" (angstlösende Arzneimittel) genannt

Alprazolam AL wird bei Erwachsenen zur Behandlung von schwerwiegenden beeinträchtigenden oder stark belastenden Angstsymptomen eingesetzt.

Behandlung vorgesehen. Was sollten Sie vor der Einnahme von Alprazolam AL

Dieses Arzneimittel ist nur zur kurzfristigen

beachten? Alprazolam AL darf NICHT eingenommen werden und informieren Sie Ihren Arzt, wenn:

Sie allergisch gegen Alprazolam, andere Benzodiazepine oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen

Bestandteile dieses Arzneimittels sind,

- Sie unter "Schlafapnoe" leiden, bei der während des Schlafs kurzfristig die Atmung aussetzt, Sie an der Muskelerkrankung Myasthenia gravis leiden,
- Sie schwere Atembeschwerden haben, Sie schwere Leberprobleme haben, Sie sich in einem akuten Vergiftungszustand durch Alkohol oder
- andere Substanzen, die das zentrale Nervensystem beeinträchtigen, befinden.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat,

wenn Sie sich bezüglich eines der oben genannten Punkte unsicher sind. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Alprazolam AL

einnehmen: wenn Sie Alkohol, Drogen oder Arzneimittel missbrauchen oder missbraucht haben,

wenn Sie Alprazolam AL über einen längeren Zeitraum eingenommen haben, da dann die Wirksamkeit abnehmen kann, wenn Sie einen schlechten

- Allgemeinzustand haben, wenn Sie Lungen-, Nieren- oder
- Leberbeschwerden haben,

 wenn Sie Schmerzmittel einnehmen, die Dextropropoxyphen enthalten. Diese Kombination sollte vermieden werden, da

sie Atemprobleme verursachen kann.

psychische Erkrankungen einnehmen.

wenn Sie andere Arzneimittel gegen

Die Einnahme von Alprazolam AL kann eine körperliche und psychische Abhängigkeit von diesem Arzneimittel verursachen. Das Abhängigkeitsrisiko nimmt mit der Höhe der

möglich sein. Befolgen Sie die

Dosis und der Therapiedauer zu. Deshalb muss die Anwendungsdauer so kurz wie

des Arzneimittels nicht beenden wollen. Körperliche Abhängigkeit bedeutet das Auftreten von Absetzungserscheinungen, wenn die Behandlung mit diesem Arzneimittel plötzlich beendet wird (siehe auch Abschnitt 3 "Wenn Sie die Einnahme von Alprazolam AL abbrechen"). Das Risiko ist auch bei denjenigen Patienten erhöht, die Alkohol oder Arzneimittel missbrauchen oder missbraucht haben. Medikamentenmissbrauch ist ein bekanntes Risiko bei diesem Arzneimittel. Wenn dieses Arzneimittel missbräuchlich angewendet wird, kann es zu Überdosierung und Tod führen. Halten Sie sich immer an die Dosierungsempfehlungen Ihres Arztes. Menschen, die verschreibungspflichtige Arzneimittel missbrauchen, könnten dieses Arzneimittel suchen. Daher sollte es außerhalb der Reichweite von anderen aufbewahrt werden. Während der Behandlung mit Alprazolam AL

Arzt, falls Sie dieses Symptom bei sich bemerken. Wenn Sie eine Psychose haben (eine schwere psychiatrische Erkrankung, die Ihr Verhalten, Ihre Handlungen und Ihre Selbstkontrolle beeinflusst), ist Alprazolam AL für Sie nicht geeignet. Auswirkungen auf die Stimmungslage Die Einnahme von Alprazolam AL kann bei

beeinträchtigt sein. Dies tritt üblicherweise mehrere Stunden nach Einnahme des

Arzneimittels auf. Bitte informieren Sie Ihren

kann Ihr Erinnerungsvermögen

Anzeichen von Hypomanie oder Manie entwickeln Die Behandlung mit Alprazolam AL kann

Geisteszustand, übermäßiges Hochgefühl

und Energie) erhöhen. Wenden Sie sich

unverzüglich an Ihren Arzt, wenn Sie

das Risiko erhöhen, dass Sie

Sie die Behandlung mit Alprazolam AL Ihr Arzt wird Sie engmaschig überwachen, wenn eine Behandlung mit Alprazolam AL erforderlich ist und Sie unter einer Depression leiden oder in der Vergangenheit

Ältere Patienten Wenn Sie älter sind, seien Sie bei der Anwendung von Alprazolam AL besonders vorsichtig, denn es kann verstärkte Müdigkeit und/oder Muskelschwäche verursachen und

Kinder und Jugendliche Alprazolam AL wird nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren empfohlen.

Einnahme von Alprazolam AL zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker,

haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden. Die Wirksamkeit der Behandlung kann

beeinträchtigt werden, wenn Alprazolam AL zusammen mit anderen Arzneimitteln, die zur Behandlung der aufgeführten Erkrankungen verwendet werden, angewendet wird. Ihr Arzt muss

ansteht (Anästhetika),

möglicherweise Ihre Dosis anpassen. • Psychische Probleme (antipsychotische Arzneimittel, einschließlich Clozapin),

Schwangerschaft planen. Beobachtungen Dosierungsempfehlungen Ihres Arztes (siehe am Menschen haben gezeigt, dass Alprazolam schädlich für den Fötus sein kann Abschnitt 3). Eine psychische Abhängigkeit erkennen Sie daran, dass Sie die Einnahme

Patienten mit Depressionen das Risiko von Episoden von Hypomanie (eine mildere Form der Manie) und Manie (hyperaktiver

selbstschädigende Gedanken oder Suizidgedanken (Selbsttötungsgedanken) entwickeln, wenn Sie eine Depression haben. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor

selbstschädigende Gedanken oder Suizidgedanken hatten. Wann immer Ihnen selbstschädigende Gedanken oder Suizidgedanken durch den Kopf gehen, kontaktieren Sie Ihren Arzt oder suchen Sie sofort eine Klinik auf.

dadurch zu einer verstärkten Sturzgefahr führen.

wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet

- Patienten mit Atemproblemen
- Schlafstörungen (Schlaftabletten), · Allergien oder Heuschnupfen (einige Antihistaminika), wenn ein größerer chirurgischer Eingriff

- Probleme wie Angstzustände oder
- Medikamentenabhängigkeit (Substitutionstherapie),

(Narkoanalgetika, z. B. Dextropropoxyphen),

Depressionen, einschließlich einige

Behandlung von

- Antidepressiva, die Fluoxetin, Fluvoxamin, Nefazodon oder Imipramin enthalten, Herzinsuffizienz (Digoxin) Infektionen (Antibiotika, die Erythromycin, Clarithromycin oder Telithromycin
 - enthalten) **Pilzinfektionen** (Itraconazol, Fluconazol, Ketoconazol, Posaconazol, Voriconazol),
 - Arzneimittel zur Behandlung von Angina pectoris und hohem Blutdruck, wie Diltiazem
- Proteasehemmer, wie Ritonavir) Sodbrennen oder Magengeschwüre (wie Cimetidin oder Omeprazol), Asthma und Bronchitis (wie Theophyllin),

HIV und AIDS (sogenannte HIV-

Epilepsie (wie Carbamazepin)

- Arzneimittel mit muskelerschlaffender Wirkung (Muskelrelaxanzien). Bei gleichzeitiger Anwendung mit Alprazolam
- kann die muskelerschlaffende Wirkung verstärkt werden und sich das Risiko für Stürze erhöhen. Die gleichzeitige Anwendung von Alprazolam AL und Opioiden (starke Schmerzmittel, Arzneimittel zur Substitutionstherapie und einige

(Atemdepression), Koma und kann lebensbedrohlich sein. Wenn Ihr Arzt jedoch Alprazolam AL zusammen mit Opioiden verschreibt, sollten die Dosis und die Dauer der begleitenden Behandlung von Ihrem Arzt begrenzt werden. Bitte informieren Sie Ihren Arzt über alle opioidhaltigen Arzneimittel, die Sie

einnehmen, und halten Sie sich genau an die

Verwandte darüber zu informieren, bei Ihnen

Dosierungsempfehlung Ihres Arztes. Es

könnte hilfreich sein, Freunde oder

Hustenmittel) erhöht das Risiko von

Schläfrigkeit, Atembeschwerden

auf die oben genannten Anzeichen und Symptome zu achten. Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn solche Symptome bei Ihnen auftreten Die Wirkung der Behandlung mit Alprazolam AL kann durch die gleichzeitige Anwendung einer der folgenden Arzneimittel beeinträchtigt werden: die Pille, Rifampicin (gegen Infektionen) oder Johanniskraut (pflanzliches Arzneimittel).

nehmen, da Sie die Kombination schläfrig machen kann. Die Tabletten sollen mit ausreichend Flüssigkeit unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden.

Einnahme von Alprazolam AL

Getränken und Alkohol

zusammen mit Nahrungsmitteln,

Wenn Sie Alprazolam AL einnehmen, sollten

Sie keine alkoholischen Getränke zu sich

Schwangerschaft und Stillzeit Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden,

Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um

Schwangerschaft Informieren Sie umgehend Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind oder eine

fragen Sie vor der Anwendung dieses

(erhöhtes Risiko für Fehlbildungen [Gaumenspalte]). Während einer Schwangerschaft sollte Alprazolam nur nach einer sorgfältigen Nutzen-Risiko-Abwägung durch Ihren Arzt angewendet werden. Ihr Arzt wird entscheiden, ob die möglichen Vorteile einer Behandlung die Risiken für das ungeborene Kind überwiegen und ob die Tabletten für Sie geeignet sind. Wenn Sie Alprazolam AL bis zur Geburt

einnehmen, informieren Sie Ihren Arzt, da Ihr

Neugeborenes nach der Geburt

die Muttermilch über.

unsicher sind.

Entzugserscheinungen haben kann.

Alprazolam AL sollte nicht eingenommen

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit

zum Bedienen von Maschinen

werden, wenn Sie stillen. Alprazolam tritt in

Die Einnahme von Alprazolam AL kann Ihr Reaktionsvermögen und Ihre Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen, da es Sie schläfrig bzw. vergesslich macht. Sie dürfen kein Fahrzeug führen und keine Maschinen bedienen, wenn diese

Symptome bei Ihnen auftreten. Fragen Sie

Ihren Arzt um Rat, wenn Sie sich

Alprazolam AL enthält Lactose, Natriumbenzoat und Natrium Bitte nehmen Sie Alprazolam AL daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter

einer Unverträglichkeit

gegenüber bestimmten

Zuckern leiden.

Natriumbenzoat: Dieses Arzneimittel enthält 0,12 mg Natriumbenzoat pro Tablette. Dieses Arzneimittel enthält Natrium: weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Tablette, d.h., es ist nahezu "natriumfrei". 3. Wie ist Alprazolam AL einzunehmen?

Arzt begonnen, überwacht und abgeschlossen werden. Die Dosis wird von Ihrem Arzt festgelegt. Ihr Arzt wird die Dosis

Erhaltungsdosis: 0,5 mg - 3 mg Alprazolam täglich, auf mehrere

Einzelgaben aufgeteilt gemäß der

Verordnung Ihres Arztes.

sicher sind.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer

Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht

genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder

Die Behandlung sollte möglichst vom selben

an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Die empfohlene Dosis beträgt Anfangsdosis: 0,25-0,5 mg Alprazolam dreimal täglich.

Dieses Arzneimittel ist nur für die kurzzeitige Anwendung bestimmt. Das Risiko von Abhängigkeit und Missbrauch kann mit der Dosis und der Behandlungsdauer zunehmen. Der Arzt wird daher die geringstmögliche wirksame Dosis und die kürzestmögliche

Behandlungsdauer verschreiben und die Notwendigkeit einer Fortsetzung der Behandlung häufig neu beurteilen (siehe Warnhinweise und Abschnitt 2 Vorsichtsmaßnahmen"). Die maximale Behandlungsdauer sollte 2 bis 4 Wochen nicht überschreiten. Eine Langzeitbehandlung

wird nicht empfohlen.

Die Tabletten können auch in zwei gleiche Dosen geteilt werden.

Die Tabletten sollten mit ausreichend

Flüssigkeit eingenommen werden.

Falls Sie unter Atemproblemen leiden (chronische Lungeninsuffizienz), verschreibt Ihnen Ihr Arzt möglicherweise eine geringere Dosis. Alprazolam AL darf von Patienten mit schweren Atemproblemen nicht eingenommen werden.





Ältere Patienten oder Patienten mit Nieren- und/oder Leberproblemen

Diese Patienten benötigen möglicherweise eine geringere Dosis. Ihr Arzt wird Ihre individuelle Dosis festlegen.

Wenn Sie eine größere Menge von Alprazolam AL eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich zu viele Tabletten eingenommen haben, nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem Arzt auf oder begeben Sie sich in die Notfallaufnahme des nächsten Krankenhauses. Nehmen Sie immer die restlichen Tabletten mit, ebenso die Verpackung und die Packungsbeilage, damit das medizinische Personal weiß, was Sie eingenommen haben. Eine Überdosierung kann folgende

Symptome aufweisen: Schwindel. Schläfrigkeit,

- · Atemprobleme,
- Verwirrtheit,
- · Bewusstlosigkeit,
- Muskelschwäche, Störung der Koordination von
- Bewegungsabläufen (Ataxie),
- Reaktionen wie Aggressivität, Halluzinationen und Erregung
- Wenn Sie die Einnahme von Alprazolam AL vergessen haben Wenn Sie vergessen haben, das Arzneimittel

einnehmen, sobald Sie daran denken. Wenn aber fast schon der Zeitpunkt für die Einnahme der nächsten Dosis gekommen ist,

zur üblichen Zeit einzunehmen, sollten Sie es

lassen Sie die vergessene Dosis aus und nehmen Sie nur die nächste Dosis ein. Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Falls Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Wenn Sie die Einnahme von Alprazolam AL abbrechen Sprechen Sie auf jeden Fall mit Ihrem Arzt, bevor Sie die Behandlung beenden. Es ist

wichtig, dass Sie Ihre Dosis in Absprache mit Ihrem Arzt schrittweise reduzieren

und Schlafstörungen führen.

In schweren Fällen können folgende Symptome auftreten: Realitätsverlust;

Ein plötzliches Absetzen der Behandlung kann zu Absetzerscheinungen, wie Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, ausgeprägten Angstzuständen, Ruhelosigkeit, Verwirrtheit, Reizzuständen

Depersonalisierung (Gefühl der Entfremdung vom eigenen "Ich"); Empfindungsverlust und Kribbelgefühl in den Armen und/oder den Beinen; Überempfindlichkeit gegenüber Licht, Geräuschen und Berührungen Halluzinationen und epileptische Anfälle (Krampfanfälle). Die Absetzerscheinungen können mehrere Tage nach Absetzen der Tabletten auftreten. Bei Beendigung der Behandlung mit

Alprazolam können die Symptome, die ursprünglich zu der Behandlung mit

Alprazolam AL geführt haben, erneut und

sogar stärker als zuvor auftreten. Zusätzlich zu den oben erwähnten Symptomen können deshalb auch Stimmungsschwankungen Ihr Arzt wird deshalb die Dosis bei Behandlungsende langsam verringern. Er wird die Dosisverringerung individuell anpassen, da diese von mehreren Faktoren (z. B. von der Dauer der Behandlung und der Höhe Ihrer Tagesdosis) abhängt. Bitte fragen

Sie Ihren Arzt, wie Sie bei der Dosisreduzierung vorgehen sollen.

an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich? wie alle Arzheimittel kann auch di Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme

dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich

umgehend an einen Arzt, wenn Sie eines der folgenden Symptome (Angioödem) verspüren:

· Anschwellen des Gesichts, der Zunge oder

aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Beenden Sie die Einnahme dieses

Arzneimittels und wenden Sie sich

des Rachens,

Folgendes auftritt:

Schluckbeschwerden, Nesselsucht und Atembeschwerden. Angioödeme wurden beobachtet, aber die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

Beenden Sie die Einnahme des

(Gelbsucht), paradoxe Reaktionen wie Angst, Ruhelosigkeit, Erregung, Reizbarkeit, Aggressionen, Wahnvorstellungen, Wutanfälle, Alpträume, Verstärkung von

Schlafstörungen, Vorstellung von Dingen,

die nicht existieren (Halluzinationen) oder schwere psychiatrische Erkrankungen, bei

Verhalten und seine Handlungen gestört

oder andere Verhaltensstörungen. Diese paradoxen Reaktionen treten bei älteren

sind (Psychosen), unangepasstes Verhalten

denen die Kontrolle über das eigene

Patienten häufiger auf.

Gelbfärbung der Augen und der Haut

Arzneimittels und kontaktieren Sie Ihren Arzt so schnell wie möglich, wenn

• Depression/depressive Gedanken. WÄHREND DER BEHANDLUNG MIT ALPRAZOLAM AL KÖNNEN FOLGENDE NEBENWIRKUNGEN AUFTRETEN: Bitte bleiben Sie in regelmäßigem Kontakt mit Ihrem Arzt. Informieren Sie ihn während dieser Routineuntersuchungen, wenn bei Ihnen eine der folgenden Nebenwirkungen aufgetreten ist. SEHR HÄUFIG (KANN MEHR ALS 1 VON 10 BEHANDELTEN BETREFFEN): · Depression, Gefühl der Betäubung (Sedierung),

Störung der Muskelkoordination (Ataxie),

Beeinträchtigung des Gedächtnisses, Schwierigkeiten beim Sprechen,

Verstopfung trockener Mund, Müdigkeit (Erschöpfung),

Schlafstörungen (Schlaflosigkeit),

HÄUFIG (KANN BIS ZU 1 VON 10 BEHANDELTEN BETREFFEN):

verminderter Appetit,

 Appetitlosigkeit, gesteigerter Appetit, Verwirrtheit. · Desorientiertheit,

Reizbarkeit.

Schläfrigkeit,

Schwindelgefühl,

Kopfschmerzen,

verminderter Sexualtrieb (verminderte Libido). • Angstzustände,

Nervosität,

- erhöhter Sexualtrieb (gesteigerte Libido), Unsicherheit beim Stehen oder Gehen (Gleichgewichtsstörung),
- Koordinationsstörungen,extreme Müdigkeit, Teilnahmslosigkeit (Lethargie), • Beben oder Zittern (Tremor),
- verschwommenes Sehen, Ubelkeit, Erbrechen,

Konzentrationsstörungen,

Hautentzündung (Dermatitis),

- sexuelle Funktionsstörung, • Gewichtsveränderung.
- GELEGENTLICH (KANN BIS ZU 1 VON 100 BEHANDELTEN BETREFFEN): überaktiver Geisteszustand, übermäßig
- erregt und energiegeladen (Manie), • Dinge sehen oder hören, die nicht real sind (Halluzinationen)
- Unruhe (Agitation), · Medikamentenabhängigkeit (siehe Abschnitt 2 "Warnhinweise und
- · Vergiftungsgefühl,
- · Muskelschwäche, • Inkontinenz,

- · sich wütend fühlen,
 - Vorsichtsmaßnahmen"), Gedächtnisverlust (Amnesie),
 - · unregelmäßige Menstruation, • Entzugssyndrom (siehe Abschnitt 2
 - "Warnhinweise und
 - Vorsichtsmaßnahmen")
- NICHT BEKANNT (HÄUFIGKEIT AUF GRUNDLAGE DER VERFÜGBAREN DATEN NICHT ABSCHÄTZBAR):
 - Überproduktion des Hormons Prolaktin, Übererregbarkeit (Hypomanie, eine mildere Form der Manie), sich aggressiv oder feindselig fühlen,

 ungewöhnliche Gedanken (Wahnvorstellungen),

- Unruhe (psychomotorische Hyperaktivität), Drogenmissbrauch (siehe Abschnitt 2
 - "Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen") • Störungen des vegetativen Nervensystems
 - (wie Herzklopfen, vermehrter Speichelfluss und verstopfte Nase), unwillkürliche Muskelkontraktionen,
 - · beeinträchtigte Reaktionsfähigkeit,
 - Sprachschwierigkeiten,
 - niedriger Blutdruck gastrointestinale Störungen,
 - Schluckbeschwerden, Entzündung der Leber (Hepatitis),
 - Probleme mit der Leberfunktion, Gelbsucht (Gelbfärbung der Haut und des
 - Weißen der Augen), Schwellungen der Knöchel, Füße oder Finger (periphere Ödeme),
 - · Hautreaktionen, die durch Sonnenlicht
 - verursacht werden, Schwierigkeiten beim Wasserlassen oder
 - Probleme bei der Kontrolle der Blase, erhöhter Flüssigkeitsdruck im Auge.
 - Eine bisher unbemerkte (latente) Depression kann in Erscheinung treten, wenn Benzodiazepine wie Alprazolam AL

angewendet werden. Während der Behandlung kann sich eine körperliche und psychische Abhängigkeit

entwickeln. Ein plötzliches Absetzen der

Behandlung kann bestimmte Symptome verursachen (siehe auch unter Abschnitt 3.: Wenn Sie die Einnahme von Alprazolam AL Meldung von Nebenwirkungen Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder

Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser

Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Abt. Pharmakovigilanz Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Alprazolam AL aufzubewahren?

unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung nach "verwendbar bis:" oder "verw. bis' angegebenen Verfallsdatum nicht mehr

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder

verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Nicht über 30°C lagern. Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das

Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder

Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen

ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter

www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Jede Tablette enthält 0,5 mg Alprazolam. Alprazolam AL 1 mg Tabletten Jede Tablette enthält 1 mg Alprazolam.

Mikrokristalline Cellulose (E 460a), Lactose-

(E 551), zusätzlich in Alprazolam AL 0,5 mg Tabletten: Erythrosin-Aluminiumsalz (É 127),

zusätzlich in Alprazolam AL 1 mg Tabletten:

Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.)

(E 470b), Hochdisperses Siliciumdioxid

Indigocarmin-Aluminiumsalz (E 132).

Die sonstigen Bestandteile sind Docusat-Natrium, Natriumbenzoat (E 211), vorverkleisterte Stärke (Kartoffel),

Was Alprazolam AL enthält

Alprazolam AL 0,5 mg Tabletten

Der Wirkstoff ist: Alprazolam

Wie Alprazolam AL aussieht und Inhalt der Packung Alprazolam AL 0,5 mg Tabletten Rosafarbene, oblonge Tablette mit Bruchkerbe auf der Oberseite und der Prägung: "APZM 0,5" auf der Unterseite. Alprazolam AL 1 mg Tabletten Hellblaue, oblonge Tablette mit Bruchkerbe

auf der Oberseite und der Prägung:

Es werden möglicherweise nicht alle

D-89150 Laichingen · info@aliud.de

Hersteller

61118 Bad Vilbel

"APZM 1" auf der Unterseite.

und 50 Tabletten erhältlich.

Packungsgrößen in den Verkehr gebracht. Pharmazeutischer Unternehmer ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 19

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18

Alprazolam AL ist in Packungen mit 10, 20

Zur Beachtung für den Patienten! Dieses Arzneimittel enthält einen Wirkstoff aus der Gruppe der Benzodiazepine!

Behandlung bestimmter Krankheitszustände,

die mit Unruhe- und Angstzuständen, innerer Spannung oder Schlaflosigkeit einhergehen

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt

überarbeitet im Februar 2023.

sowie zur Behandlung der Epilepsie und bestimmter Muskelverspannungen. Nicht alle Angst- oder Schlafstörungen

bedürfen der Behandlung mit einem Arzneimittel. Oftmals sind sie Ausdruck

andersartige Maßnahmen oder eine

werden.

körperlicher oder seelischer Erkrankungen

oder anderer Konflikte und können durch

Behandlung der Grunderkrankung beeinflusst

Benzodiazepine beseitigen nicht die Ursache

Benzodiazepine sind Arzneimittel zur

der Störung. Sie vermindern den Leidensdruck und können darüber hinaus eine wichtige Hilfe sein, um z.B. den Zugang für eine weiterführende Behandlung und die entsprechende Problemverarbeitung zu Bei der Anwendung von Benzodiazepin-Arzneimitteln kann es zu einer Abhängigkeit kommen. Um dieses Risiko so gering wie

nur auf ärztliche Anweisung angewendet Eine unkontrollierte längerfristige Anwendung muss vermieden werden, da sie zu einer Arzneimittelabhängigkeit führen kann. Innerhalb der Therapiedauer sollte deshalb frühzeitig der Arzt aufgesucht werden, damit dieser über eine

Weiterbehandlung entscheiden kann. Bei

Anweisung verringert sich die Chance,

einer Anwendung ohne ärztliche

Ihnen durch ärztliche Verordnung mit diesen Arzneimitteln zu helfen. • Erhöhen Sie auf keinen Fall die vom Arzt vorgeschriebene Dosis, auch nicht, wenn die Wirkung nachlässt. Dies kann ein

können – oft mit Verzögerung von einigen Tagen – Unruhe, Angstzustände und Schlaflosigkeit auftreten. Diese Absetzerscheinungen verschwinden nach einigen Tagen bis Wochen. Wenn Sie derzeit oder früher einmal abhängig von Alkohol, Arzneimitteln oder

ausgenommen. Machen Sie Ihren Arzt auf diesen Umstand aufmerksam. • Nehmen Sie Benzodiazepin-Arzneimittel Sie diese nicht an, weil sie "anderen so gut

möglich zu halten, wird Ihnen geraten, die

folgenden Hinweise genau zu beachten:

Benzodiazepine sind allein zur Behandlung

Bei Absetzen nach längerem Gebrauch

nie von anderen entgegen, und wenden geholfen haben". Geben Sie diese Arzneimittel nie an andere weiter.

9310097 2303

600100062