

Gebrauchsinformation

## **Acidum formicicum**

Synergon Nr. 140

Homöopathisches Arzneimittel

### **Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

### **Gegenanzeigen:**

keine bekannt

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

keine bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Warnhinweis:** Enthält 57 Vol.-% Alkohol

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich je 5 Tropfen vor den Mahlzeiten in Flüssigkeit einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Hinweis: Zum Tropfen ist die Flasche senkrecht mit der Öffnung nach unten zu halten.

### **Nebenwirkungen:**

keine bekannt

Hinweis: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum. Nicht über 25°C lagern.

**Zusammensetzung:**

10 g (10,9 ml) Mischung flüssiger Verdünnungen  
enthält:

Wirkstoffe:	D 12	1,7 g
Acidum formicicum Dil.	D 2	1,7 g
Aralia racemosa Dil.	D 1	1,7 g
Cardiospermum halicacabum Dil.	D 3	1,7 g
Thryallis glauca Dil.	D 6	1,7 g
Cuprum metallicum Dil.	D 12	1,5 g
Histaminum dihydrochloricum Dil.		

1 g (1,09 ml) entspricht 35 Tropfen

**Darreichungsform und Inhalt:**

20, 50 ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Kattwiga Arzneimittel GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

**Stand der Information:** Juli 2017