



5

Anacardium

F Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

Zusammensetzung:

10 g (= 11,12 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame

Bestandteile: Anacardium D4 Dil., Hyoscyamus D4 Dil.,

Cocculus D4 Dil. je 3,3333 g

Dieses Präparat enthält 64,7 Vol.-% Alkohol.

Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer

therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung

fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2513035.00.00

Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

5 Anacardium F Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne

Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 5 Anacardium F Komplex nicht einnehmen?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 5 Anacardium F Komplex

bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 5 Anacardium F Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden? Wegen des

Alkoholgehaltes soll 5 Anacardium F Komplex bei

Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen

Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem

Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und

Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 64,7 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung

werden bei der Akutdosierung bis zu 0,78 g Alkohol und bei

der chronischen Dosierung bis zu 0,39 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken,

Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder

Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die

Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder

verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit

beachten? Da keine ausreichend dokumentierten

Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und

Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach

Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen

keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll

deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet

werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle

halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5

Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem

Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne

medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen mit

einem Teelöffel Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der

Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

siehe Rückseite

Stand der Information: April 2016