

* 2 6 7 4 8 4 4 0 *

161 Cistus canad.

F Komplex
Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
10 g (= 11,01 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cistus canadensis (HAB 1934) Dil. D3 (HAB, Vorschr. 3a), Staphisagria Dil. D4, Anacardium Dil. D4, Apis mellifica Dil. D4, Croton tiglium Dil. D4, Hydrocotyle asiatica Dil. D4, Mezereum Dil. D4, Dolichos pruriens Dil. D4 je 1,25 g
Dieses Präparat enthält 61,5 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 2512442.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
161 Cistus canad. F Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 161 Cistus canad. F Komplex nicht einnehmen? 161 Cistus canad. F Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei einer Bienengiftüberempfindlichkeit nicht angewendet werden.
Wann dürfen Sie 161 Cistus canad. F Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden? Wegen des Alkoholgehaltes soll 161 Cistus canad. F Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Wegen des Bestandteiles Croton tiglium darf 161 Cistus canad. F Komplex in der Schwangerschaft nicht angewendet werden.
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, darf 161 Cistus canad. F Komplex in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Warnhinweis:
Dieses Arzneimittel enthält 61,5 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,73 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,37 g Alkohol zugeführt.
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
siehe Rückseite
Stand der Information: Mai 2016