

* 0 4 9 4 8 4 4 0 *

262

Podophyllum Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung: 10 g (= 10,83 ml) Mischung enthalten:
Arzneilich wirksame Bestandteile: Belladonna Dil. D4, Berberis Dil. D3, Carduus marianus Dil. D2, China Dil. D4, Colocynthis Dil. D4, Glonoinum Dil. D4, Lycopodium Dil. D4, Leptandra Dil. D3, Natrium sulfuricum Dil. D3, Nux vomica Dil. D4, Podophyllum Dil. D4 je 0,9091 g
Dieses Präparat enthält 54,3 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 2513022.00.00

Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation
262 Podophyllum Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 21 Tropfen.

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 262 Podophyllum Komplex nicht einnehmen?
Wegen des Alkoholgehaltes soll 262 Podophyllum Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.
Wann dürfen Sie 262 Podophyllum Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
Wegen des Alkoholgehaltes soll 262 Podophyllum Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
262 Podophyllum Komplex soll in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Warnhinweis:
Dieses Arzneimittel enthält 54,3 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,66 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,33 g Alkohol

zugeführt.
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5

Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
Keine bekannt. Siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
siehe Rückseite
Stand der Information: Mai 2016