



82

# Sambucus

## F Komplex

Homöopathisches  
Arzneimittel

### Mischung zum Einnehmen

#### Zusammensetzung:

10 g (= 11,14 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Salvia officinalis Dil. D2, Eucalyptus Dil. D3, Boletus laricis Dil. D4, China Dil. D4, Sambucus Dil. D2, Acidum sulfuricum Dil. D4 je 1,6667 g  
Dieses Präparat enthält 65,5 Vol.-% Alkohol.  
Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nicht über 25 °C lagern.

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 61636.00.00

Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

### Gebrauchsinformation

**82 Sambucus F Komplex** Homöopathisches Arzneimittel

Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

1 g entspricht 22 Tropfen

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

NESTMANN Pharma GmbH, Weiherweg 17, D-96199

Zapfendorf/Bamberg, Tel. 09547/92210, Fax 09547/215

#### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweise: siehe Rückseite.

#### Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 82 Sambucus F Komplex nicht einnehmen?

82 Sambucus F Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei einer Chininüberempfindlichkeit nicht angewendet werden. Nicht anwenden bei Kindern unter 1 Jahr.

Wann dürfen Sie 82 Sambucus F Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 82 Sambucus F Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Warnhinweis: Dieses Arzneimittel enthält 65,5 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,79 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,39 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern von 1 bis unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

#### Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

#### Dauer der Anwendung:

siehe Rückseite

#### Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen können nach Anwendung von chininhaltigen Arzneimitteln Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautallergien oder Fieber auftreten. In diesen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen. Hinweis: Eine Sensibilisierung gegen Chinin oder Chinidin ist möglich. Hinweis: siehe Rückseite.

#### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

siehe Rückseite

#### Stand der Information:

April 2016