

Pharmazeutischer
Unternehmer und Hersteller:
orochemie GmbH + Co. KG 
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim, Germany
Stand der Information: 09.2020



C 20 Hände + Haut Desinfektion



2-Propanol 70 % (V/V)

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur
Bereitung von Umschlägen.

Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA,
tuberkulozid, leuurozid, begrenzt viruzid
PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV,
Coronaviren sowie unbehüllten Rotaviren,
Noroviren und Adenoviren). VAH-gelistet,
RKI-gelistet.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten
als Wirkstoff 2-Propanol 63,1 g. Sonstige
Bestandteile: gereinigtes Wasser. **Darrei-
chungsform und Inhalt:** 125 ml Lösung.

Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die
Haut und zur Bereitung von Umschlägen. **Vor-
sichtsmaßnahmen/Warnhinweise:** Flüssig-
keit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze/
Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen
fernhalten. Nicht rauchen. Flammpunkt: 19 °C.
Nur äußerlich anwenden. Kontakt mit den
Augen vermeiden. **Aufbewahrungshinweise:**
Dicht verschlossen aufbewahren. **Hinweise
und Angaben zur Haltbarkeit:** Das Arznei-
mittel darf nach Ablauf des Verfalldatums
- siehe Aufdruck - nicht mehr angewendet
werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich
aufbewahren.

Ch.-B./verwendbar bis: siehe Aufdruck
Zul.-Nr. 1599.98.99 REF N.C20.20.01.02



PZN -06157659

E.C20.19.02.01-2020-09

Pharmazeutischer Unter-
nehmer und Hersteller:

orochemie

 orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim,
Germany

☎ +49 7154 1308-0
www.orochemie.de



125 ml

C 20

2-Propanol 70 % (V/V)

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen. Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllten Rotaviren, Noroviren und Adenoviren). VAH-gelistet. RKI-gelistet.

Gebrauchsinformation C 20

2-Propanol 70 % (V/V)

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten als Wirkstoff 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt: 125 ml Lösung.

Stoff-/Indikationsgruppe: Desinfektionsmittel.

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühllumschläge.

Gegenanzeigen: C 20 ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf C 20 nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen

Mitteln: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen/

Warnhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Flammpunkt: 19 °C. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nur äußerlich anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Dosierungsanleitung/Art

und Dauer der Anwendung: Zur hygienischen Händedesinfektion Hände mit C 20 einreiben und 30 Sekunden lang feucht halten. Zur chirurgischen Händedesinfektion Hände und Unterarme mit C 20 einreiben und 5 Minuten lang feucht halten.

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße Haut mit C 20 sorgfältig abreiben und 15 Sekunden lang feucht halten.

Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken Haut mit C 20 sorgfältig abreiben und 1 Minute lang feucht halten.

Zur Desinfektion talgdrüsenreicher Haut diese mit C 20 sorgfältig abreiben und 10 Minuten lang feucht halten.

Für Kühllumschläge C 20 mit gleichen Teilen Wasser verdünnen.

Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. C 20 wirkt nicht Sporen abtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut mit C 20 können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Aufbewahrungshinweise:

Dicht verschlossen aufbewahren.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit: Das Arzneimittel darf nach Ablauf des Verfalldatums - siehe Aufdruck - nicht mehr angewendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Haltbarkeit nach Öffnen des Behältnisses 12 Monate. Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.



C 20

Hände + Haut Desinfektion



2-Propanol 70 % (V/V)

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur
Bereitung von Umschlägen.

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA,
tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid
PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV,
Coronaviren sowie unbehüllten Rotaviren,
Noroviren und Adenoviren). VAH-gelistet.

RKI-gelistet.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthal-
ten als Wirkstoff 2-Propanol 63,1 g. Sonstige
Bestandteile: gereinigtes Wasser. **Darrei-
chungsform und Inhalt:** 500 ml Lösung. **Art**

der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut
und zur Bereitung von Umschlägen. **Vorsichts-
maßnahmen/Warnhin-weise:** Flüssigkeit und
Dampf leicht entzündbar. Von Hitze/Funken/
offener Flamme/heißen Oberflächen fernhal-
ten. Nicht rauchen. Flammpunkt: 19 °C. Nur
äußerlich anwenden. Kontakt mit den Augen
vermeiden. **Aufbewahrungshinweise:** Dicht
verschlossen aufbewahren. **Hinweise und**

Angaben zur Haltbarkeit: Das Arzneimittel darf
nach Ablauf des Verfalldatums - siehe Aufdruck
- nicht mehr angewendet werden. Arzneimittel
für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Ch.-B./verwendbar bis: siehe Aufdruck.

Zul.-Nr. 1599.98.99 REF N.C20.35.01.01



PZN -10744782

Pharmazeutischer Unternehmer
und Hersteller:

orochemie

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim, Germany
☎ +49 7154 1308-0
www.orochemie.de



500 ml

E.C20.44.02.01-2020-09

C 20

2-Propanol 70 % (V/V)

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt vrizulid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllten Rotaviren, Noroviren und Adenoviren). VAH-gelistet. RKI-gelistet.

Gebrauchsinformation C 20

2-Propanol 70 % (V/V)

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten als Wirkstoff 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt:

500 ml Lösung.

Stoff-/Indikationsgruppe:

Desinfektionsmittel.

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlmuschläge.

Gegenanzeigen: C 20 ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Über-

empfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf C 20 nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen

Mitteln: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Flammpunkt: 19 °C. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nur äußerlich anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Dosierungsanleitung/Art und Dauer

der Anwendung: Zur hygienischen Händedesinfektion Hände mit C 20 einreiben und 30 Sekunden lang feucht halten. Zur chirurgischen Händedesinfektion Hände und Unterarme mit C 20 einreiben und 5 Minuten lang feucht halten.

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße Haut mit C 20 sorgfältig abreiben und 15 Sekunden lang feucht halten.

Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken Haut mit C 20 sorgfältig abreiben und 1 Minute lang feucht halten.

Zur Desinfektion talgdrüsenreicher Haut diese mit C 20 sorgfältig abreiben und 10 Minuten lang feucht halten.

Für Kühlmuschläge C 20 mit gleichen Teilen Wasser verdünnen.

Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. C 20 wirkt nicht Sporen abtötend und ist

daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut mit C 20 können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Aufbewahrungshinweise:

Dicht verschlossen aufbewahren.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:

Das Arzneimittel darf nach Ablauf des Verfalldatums - siehe Aufdruck - nicht mehr angewendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Haltbarkeit nach Öffnen des Behältnisses 12 Monate. Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arzneimittelsorgung.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim, Germany
Stand der Information: 09.2020





C 20

Hände + Haut Desinfektion



2-Propanol 70 % (V/V)

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllten Rotaviren, Noroviren und Adenoviren). VAH-gelistet. RKI-gelistet.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten als Wirkstoff 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser. **Darreichungsform und Inhalt:** 1 l Lösung. **Art der Anwendung:** Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.

Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Flammpunkt: 19 °C. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nur äußerlich anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. **Aufbewahrungshinweise:** Dicht verschlossen aufbewahren. **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:** Das Arzneimittel darf nach Ablauf des Verfalldatums - siehe Aufdruck - nicht mehr angewendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Ch.-B./verwendbar bis: siehe Aufdruck.
Zul.-Nr. 1599.98.99 REF N.C20.55.01.01



PZN -06157671

Pharmazeutischer Unternehmer
und Hersteller:

orochemie

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim, Germany
+49 7154 1308-0
www.orochemie.de



11

E.C20.10.02.01-2020-09

201.303.002 / 215.620.002
A60.06448
98x140

Gebrauchsinformation C 20

2-Propanol 70 % (V/V)

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten als Wirkstoff 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt:

1 l Lösung.

Stoff-/Indikationsgruppe:

Desinfektionsmittel.

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühllumschläge.

Gegenanzeigen: C 20 ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf C 20 nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Flammpunkt: 19 °C. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nur äußerlich anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Dosierungsanleitung/Art und Dauer

der Anwendung: Zur hygienischen Händedesinfektion Hände mit C 20 einreiben und 30 Sekunden lang feucht halten. Zur chirurgischen Händedesinfektion Hände und Unterarme mit C 20 einreiben und 5 Minuten lang feucht halten.

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße Haut mit C 20 sorgfältig abreiben und 15 Sekunden lang feucht halten.

Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken Haut mit C 20 sorgfältig abreiben und 1 Minute lang feucht halten.

Zur Desinfektion talgdrüsenreicher Haut

diese mit C 20 sorgfältig abreiben und 10 Minuten lang feucht halten.

Für Kühllumschläge C 20 mit gleichen Teilen Wasser verdünnen.

Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern.

C 20 wirkt nicht Sporen abtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut mit C 20 können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Aufbewahrungshinweise:

Dicht verschlossen aufbewahren.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:

Das Arzneimittel darf nach Ablauf des Verfalldatums - siehe Aufdruck - nicht mehr angewendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Haltbarkeit nach Öffnen des Behältnisses 12 Monate. Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arnzeimittleentsorgung.

Pharmazeutische

Unternehmer und Hersteller:

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim, Germany
Stand der Information: 09.2020



C 20

Hände + Haut Desinfektion



2-Propanol 70 % (V/V)

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen. Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllten Rotaviren, Noroviren und Adenoviren). VAH-gelistet. RKI-gelistet.

Gebrauchsinformation C 20

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten als Wirkstoff 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser. **Darreichungsform und Inhalt:** 10 l Lösung. **Stoff-/Indikationsgruppe:** Desinfektionsmittel. **Art der Anwendung:** Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge. **Gegenanzeigen:** C 20 ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf C 20 nicht angewendet werden. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt. **Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Flammpunkt: 19 °C. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nur äußerlich anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. **Dosierungsanleitung/Art und Dauer der Anwendung:** Zur hygienischen Händedesinfektion Hände mit C 20 einreiben und 30 Sekunden lang feucht halten. Zur chirurgischen Händedesinfektion Hände und Unterarme mit C 20 einreiben und 5 Minuten lang feucht halten. Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße Haut mit C 20 sorgfältig abreiben und 15 Sekunden lang feucht halten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken Haut mit C 20 sorgfältig abreiben und 1 Minute lang feucht halten. Zur Desinfektion talgdrüsenreicher Haut diese mit C 20 sorgfältig abreiben und 10 Minuten lang feucht halten. Für Kühlumschläge C 20 mit gleichen Teilen Wasser verdünnen. Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. **Hinweise:** Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. C 20 wirkt nicht Sporen abtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit C 20 können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. **Aufbewahrungshinweise:** Dicht verschlossen aufbewahren. **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:** Das Arzneimittel darf nach Ablauf des Verfalldatums - siehe Aufdruck - nicht mehr angewendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Haltbarkeit nach Öffnen des Behältnisses 12 Monate. Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arszneimittelsorgung.

Stand der Information: 09.2020

Ch.-B./verwendbar bis: siehe Aufdruck
Zul.-Nr. 1599.98.99 REF N.C20.91.01.01

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

orochemie

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim, Germany
Tel: +49 7154 1308-0
www.orochemie.de



PZN -09327079



101

E.C20.04.02.01-2020-09