

## Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger

Desinfektionsmittel – Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen  
Lösung zur Anwendung bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen

Wirkstoff: 2-Propanol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor Anwendung von Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger beachten?
3. Wie ist Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. Was ist Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger und wofür wird es angewendet?

**Stoff-/Indikationsgruppe:** Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger ist ein Desinfektionsmittel.

**Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühllumschläge

### 2. Was müssen Sie vor Anwendung von Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger beachten?

#### Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger darf nicht angewendet werden:

- zur Desinfektion offener Wunden
- für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger ist erforderlich:**

- Augenkontakt soll vermieden werden.
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Bei Anwendung von Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger mit anderen Arzneimitteln:**

- Keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### Warnhinweise:

- Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten!
- Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

#### Schwangerschaft und Stillzeit:

- Es liegen keine Untersuchungen zum Einsatz von Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger während Schwangerschaft und Stillzeit vor. Der Einsatz von Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger sollte nur auf Anweisung eines Arztes bei vitaler Indikation nach einer Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

- Die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen kann nach Einatmen von Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger durch Schläfrigkeit und Benommenheit eingeschränkt sein.

Verunreinigung des Inhalts der Flasche sind zu vermeiden: Es dürfen keine Gegenstände eingetaucht werden. Entnommene Lösung darf nicht in die Flasche zurückgegossen werden.

### 3. Wie ist Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger anzuwenden?

Wenden Sie Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten. Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten.

Für Kühllumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

**Hinweis:**

Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger wirkt nicht sporentötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

**Art der Anwendung:** Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen

**Dauer und Häufigkeit der Anwendung:**

Hinweis: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkungszeiten zu verlängern.

Wenn Sie Fragen zur Anwendung von Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Mögliche Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn die aufgeführte Nebenwirkung Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

**Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger aufzubewahren?**

Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Nach Anbruch einer Flasche gilt eine Aufbrauchfrist von 4 Wochen.

**Aufbewahrungsbedingungen:** Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger ist dicht verschlossen aufzubewahren und von Zündquellen fern zu halten! Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger ist vor direktem Sonnenlicht zu schützen.

**Warnhinweis:** Leicht entzündlich! Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Entsorgen Sie das Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker oder Ihren örtlichen Entsorgungsbetrieb, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

**Was Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger enthält:**

Der Wirkstoff ist: 2-Propanol

100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol

Die sonstigen Bestandteile sind: Gereinigtes Wasser

**Wie Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger aussieht und Inhalt der Packung:**

Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger ist eine klare und farblose Lösung.

Isopropylalkohol 70% (V/V) Hedinger ist erhältlich als 1000 ml Lösung.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

Aug. Hedinger GmbH & Co. KG

Heiligenwiesen 26, D-70327 Stuttgart

Telefon: 0711/402050

Telefax: 0711/4020535

E-Mail: [info@hedinger.de](mailto:info@hedinger.de)

**Hersteller:**

Aug. Hedinger GmbH & Co. KG

Niederlassung Sachsen-Anhalt

Lange Lauchstädter Straße 47

D-06179 Teutschenthal

Standardzulassungsnummer: 1599.98.99

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2020.**