



# Gebrauchsinformation

*Liebe Patientin, lieber Patient!*

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## SANUKEHL® Coli D6 Flüssige Verdünnung

### Homöopathisches Arzneimittel



**Wirkstoff:** Escherichia coli extractum cellulae (lyophil., steril.) Dil. D6

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Hinweis an den Anwender:** Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

**Gegenanzeigen:** Keine bekannt. Siehe unter Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft nicht und in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 3 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 3 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

*Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von SANUKEHL® Coli D6?*

Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel oder Therapien können die Wirksamkeit von **SANUKEHL® Coli D6** beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

**Allgemeiner Hinweis:** Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel und wie oft sollten Sie SANUKEHL® Coli D6 anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet, werden bei akuten Krankheitszuständen vor einer Mahlzeit 5-10 Tropfen alle 12 bis 24 Stunden eingenommen. Bei chronischen Verlaufsformen werden 10 Tropfen alle 2 Tage eingenommen.

Kinder zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis.

**SANUKEHL® Coli D6** kann auch in die Haut eingegeben werden; bei dieser Art der Anwendung werden alle 1 bis 2 Tage 5-10 Tropfen in die Ellenbeugen eingegeben.



Wie lange sollten Sie **SANUKEHL® Coli D6** anwenden?

Nach längstens 8 Wochen Therapiedauer sollte eine mehrmonatige Therapiepause eingelegt werden.

### **Nebenwirkungen:**

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **SANUKEHL® Coli D6** auftreten?

Aufgrund des Gehaltes von **SANUKEHL® Coli D6** an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

In diesem Fall sollten Sie die Anwendung unterbrechen und Ihren Arzt aufsuchen.

**Hinweis:** Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! – Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. – Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. – Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

### **Zusammensetzung:**

10 ml flüssige Verdünnung enthalten:

Wirkstoff:

10 ml **Escherichia coli extractum celluluae (lyophil., steril.) Dil. D6** (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)

**Darreichungsform und Inhalt:** 10 ml / 10 x 10 ml flüssige Verdünnung zum Einnehmen und Einreiben.



## **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**SANUM-Kehlbeck**

GmbH & Co. KG

Postfach 1355 · D-27316 Hoyta

Tel.: + 49 (0)42 51 - 9352-0

Fax: + 49 (0)42 51 - 93 52-291

E-Mail: [info@sanum.com](mailto:info@sanum.com)

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Reg.-Nr.: 33074.00.00

Apothekenpflichtig

**Stand der Gebrauchsinformation: 03 / 2016**



Trennung  
an der abtastenden  
Lasche  
anfassen  
und runderum  
abziehen.



Weiße Schutzkappe  
mit Daumen und  
Zeigefinger  
kräftig anfassen  
und zur Seite  
abknicken.



Tropfenweise Ent-  
nahme durch vor-  
sichtiges Zusam-  
mendrücken der Gummipipette mit Daumen  
und Zeigefinger



Nach Gebrauch  
Schutzkappe fest auf-  
drücken bis sie hörbar  
einrastet. Hierdurch  
dichter Verschluss der  
Tropfflasche.