

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Zinksalbe Dialon®

10%ige Salbe

Wirkstoff: Zinkoxid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Zinksalbe Dialon® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Zinksalbe Dialon® und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Zinksalbe Dialon® beachten?
3. Wie ist Zinksalbe Dialon® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Zinksalbe Dialon® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ZINKSALBE DIALON® UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Zinksalbe Dialon® ist ein Wundbehandlungsmittel.

Zinksalbe Dialon® wird angewendet zur Unterstützung der Wundheilung, auch bei nässenden oder juckenden Wunden, Schrunden; Verwendung als Decksalbe.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ZINKSALBE DIALON® BEACHTEN?

Zinksalbe Dialon® darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem wirksamen Bestandteil oder einem der sonstigen Bestandteile von Zinksalbe Dialon® sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Zinksalbe Dialon® ist erforderlich

Bei Anwendung von Zinksalbe Dialon® mit anderen Arzneimitteln:

Vor der Anwendung anderer Externa (Mittel zur äußerlichen Anwendung) ist die Zinksalbe vollständig zu entfernen (eingeschränkte Wirkung weiterer Externa).

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Bisher liegen keine Erkenntnisse vor, die gegen eine Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit sprechen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Zinksalbe Dialon®:

Cetylstearylalkohol und Wollwachs können örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. WIE IST ZINKSALBE DIALON® ANZUWENDEN?

Wenden Sie Zinksalbe Dialon® immer genau nach der Anweisung dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Die Salbe einmal bis mehrmals täglich auftragen.

Art der Anwendung:

Zum Auftragen auf die Haut.

Die Salbe auf die betroffenen Hautpartien auftragen und gegebenenfalls mit Mull abdecken.

Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Zinksalbe Dialon® zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Zinksalbe Dialon® angewendet haben als Sie sollten:

Es sind keine Folgen zu erwarten. Führen Sie die Behandlung wie in der Dosierungsanleitung angegeben fort.

Wenn Sie die Anwendung von Zinksalbe Dialon® vergessen haben:

Setzen Sie die Behandlung, wie in der Dosierungsanleitung angegeben, fort.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Zinksalbe Dialon® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeiten zugrundegelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelter von 10
Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten: weniger als 1 Behandelter von 10.000
Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Gelegentlich kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen der Haut kommen.

Nach dem Auftragen von Zinksalbe auf stark entzündete Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte,
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de
anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST ZINKSALBE DIALON® AUFZUBEWAHREN?

➔ Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden! Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN**Was enthält Zinksalbe Dialon®?**

Der Wirkstoff ist Zinkoxid.

100 g Salbe enthalten 10 g Zinkoxid.

Die sonstigen Bestandteile sind: Wollwachsalkohole, weißes Vaseline, Cetylstearylalkohol.

Wie sieht Zinksalbe Dialon® aus und der Inhalt der Packung:

Zinksalbe Dialon® ist in Packungen mit 25 g und 50 g Salbe erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3
61138 Niederdorfelden
Tel.: 06101 / 539 – 300
Fax: 06101 / 539 – 315
Internet: www.engelhard-am.de
e-mail: info@engelhard-am.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im April 2014.

