

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

### **Gebrauchsinformation**

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

### **B2-ASmedic®**

Tablette mit 10 mg Riboflavin

Wirkstoff: Riboflavin

### **Stoffgruppe:**

Vitaminpräparat

### **Anwendungsgebiete:**

Vitamin-B<sub>2</sub>-Mangelzustände, wie entzündliche Veränderungen der Haut und Schleimhäute; Störungen der Vitamin-B<sub>2</sub>-Resorption, wie z. B. bei chronischer Entzündung der Darmschleimhaut (Enteritiden) oder Fettstuhl.

### **Was müssen Sie vor der Einnahme von B2-ASmedic® beachten?**

#### **Gegenanzeigen:**

*Wann dürfen Sie B2-ASmedic® nicht einnehmen?*

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von B2-ASmedic® ist erforderlich:**

*Was müssen Sie während der Schwangerschaft und in der Stillzeit beachten?*

Es sind keine Einschränkungen bekannt.

*Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?*

Es sind keine Beeinträchtigungen dieser Tätigkeit durch die Einnahme von B2-ASmedic® bekannt.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder anderen Mitteln:**

*Welche anderen Arzneimittel oder anderen Mittel beeinflussen die Wirkung von B2-ASmedic®?*

Die Resorption von Riboflavin kann durch gleichzeitige Gabe von Probenecid vermindert werden.

**Warnhinweise:**

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von B2-ASmedic®

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie B2-ASmedic® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt B2-ASmedic® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da B2-ASmedic® sonst nicht richtig wirken kann!

**Dosierung:**

*Wieviel von B2-ASmedic® Tabletten und wie oft sollten Sie B2-ASmedic® anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 1- bis 2mal täglich 1 Tablette ein, Kinder 1- bis 2mal täglich ½ Tablette.

**Art der Anwendung:**

*Wie sollten Sie B2-ASmedic® anwenden?*

Tabletten zur oralen Anwendung.

**Wenden Sie sich bei Fragen zur Klärung der Anwendung bitte an Ihren Arzt oder Apotheker!**

**Nebenwirkungen:**

Wie alle Arzneimittel kann B2-ASmedic Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
Häufig:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:	kann bis zu 1 von 1 000 Behandelten betreffen
Sehr selten:	kann bis zu 1 von 10 000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von B2-ASmedic® auftreten?*

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung sind keine Nebenwirkungen bekannt.

*Meldung von Nebenwirkungen:*

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Personal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit und Aufbewahrung des Arzneimittels:**

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf den Blistern und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

*Wie ist B2-ASmedic<sup>®</sup> aufzubewahren?*

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Achten Sie stets darauf, dass Sie B2-ASmedic<sup>®</sup> so aufbewahren, dass sie für Kinder nicht zu erreichen sind!

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

**Weitere Informationen:**

**Zusammensetzung:**

**Arzneilich wirksamer Bestandteil:**

1 Tablette enthält 10 mg Riboflavin

**Sonstige Bestandteile:**

Lactose, Maisstärke, mikrokrist. Cellulose, Talkum, Povidon 25, Siliciumdioxid, hydr. Rizinusöl

**Darreichungsform und Inhalt:**

Packung mit 20 Tabletten (N1)

Packung mit 50 Tabletten (N2)

**Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:**

Dyckerhoff Pharma GmbH & Co. KG

Robert-Perthel-Straße 49

D-50739 Köln

Tel: 0221 / 95 74 37 – 0

Fax: 0221 / 95 74 37 – 45

**Datum der letzten Überarbeitung:**

Juni 2015