

Resactiv®

homöopathisches Arzneimittel

Mischung

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Resactiv® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Resactiv® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Resactiv® beachten?
3. Wie ist Resactiv® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Resactiv® aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST RESACTIV® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Resactiv® ist ein homöopathisches Arzneimittel ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON RESACTIV® BEACHTEN?

Resactiv® darf nicht eingenommen werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Resactiv® sind.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern bis 12 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern bis 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Einnahme von Resactiv® zusammen mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Resactiv®:

Dieses Arzneimittel enthält 40 Vol.-% Alkohol.

In der Einzeldosierung von 5 Tropfen sind 0,07 ml Ethanol enthalten. Die Alkoholmenge von 5 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 2 ml Bier, 0,6 ml Wein oder 35 ml Apfelsaft.

3. WIE IST RESACTIV® EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Resactiv® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt Resactiv® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Resactiv® sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anders verordnet nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe bis ganz Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 bis 10 Tropfen ein.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3 mal täglich je 5 bis 10 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Nehmen Sie die Tropfen bitte mit ausreichend Flüssigkeit ein, z.B. in einem Glas Wasser (200 ml). Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten.

Wie lange sollten Sie Resactiv® einnehmen?

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Halten Sie sich auch dann an die Anwendungsvorschriften, wenn Sie sich bereits nach kürzerer Zeit besser fühlen. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge Resactiv® eingenommen haben, als Sie sollten

Von den homöopathischen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten. Bei Einnahme von sehr großen Mengen ist jedoch der Alkoholgehalt zu berücksichtigen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Arzneimittel ist dann abzusetzen.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST RESACTIV® AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Resactiv® enthält:

100 ml enthalten an Wirkstoffen:

Acidum arsenicosum Dil. D8, Acidum hydrofluoricum Dil. D8, Acidum silicicum Dil. D8, Aluminium metallicum Dil. D8, Argentum nitricum Dil. D8, Aurum metallicum Dil. D8, Bismutum metallicum Dil. D8, Calcium phosphoricum Dil. D8, Cobaltum metallicum Dil. D8, Cuprum metallicum Dil. D8, Echinacea Dil. D1, Lithium carbonicum Dil. D8, Magnesium sulfuricum Dil. D6, Manganum aceticum Dil. D8, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D8, Natrium chloratum Dil. D6, Niccolum metallicum Dil. D8, Phosphorus Dil. D8, Platinum metallicum Dil. D8, Plumbum aceticum Dil. D8, Selenium metallicum Dil. D8, Stannum metallicum Dil. D8, Stibium sulfuratum nigrum Dil. D8, Sulfur Dil. D8, Tellurium metallicum Dil. D8, Thallium aceticum oxydulatum Dil. D8, Zincum metallicum Dil. D8 je 3,6 ml.

Sonstiger Bestandteil: Ethanol 43% (m/m).

1 ml entspricht 21 Tropfen

Wie Resactiv® aussieht und Inhalt der Packung:

Tropfflasche aus Braunglas mit einer klaren, gelblichen Flüssigkeit
Originalpackung mit 50 ml (N1) und 100 ml (N2) Mischung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Infirmarius GmbH

Daimlerstraße 19

D-73037 Göppingen

Tel.: +49 7161 60694-0

Fax: +49 7161 60694-90

E-Mail: info@infirmarius.de



Apothekenpflichtig

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Mai 2021 überarbeitet.