



**86**

**Arsen.  
sulfur.**  
F Komplex  
Homöopathisches  
Arzneimittel

**Mischung zum Einnehmen**

**Zusammensetzung:**  
10 g (= 10,79 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Passiflora incarnata D2 Dil., Myrrha D3 Dil., Baptisia (HAB 1934) D3 Dil. (HAB, Vorschr. 3a), Aqua silicata, Auripigmentum D8 Dil. (HAB, Vorschr. 6), Echinacea D4 Dil., Aloe D4 Dil. je 1,4286 g  
Dieses Präparat enthält 52,3 Vol.-% Alkohol.  
Packungsbeilage beachten!  
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.  
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!  
Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren.  
Reg.-Nr.: 2513046.00.00 Inhalt: 50 ml  
**Ch.-B.: 0000**

**Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation**

**86 Arsen. sulfur. F Komplex** Homöopathisches Arzneimittel  
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml  
1 g entspricht 21 Tropfen  
**Anwendungsgebiete:**  
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweise: siehe Rückseite.  
**Gegenanzeigen:**  
Wann dürfen Sie 86 Arsen. sulfur. F Komplex nicht einnehmen?  
Wegen des Alkoholgehaltes soll 86 Arsen. sulfur. F Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.  
86 Arsen. sulfur. F Komplex ist bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler nicht anzuwenden.  
Aus grundsätzlichen Überlegungen nicht anzuwenden bei

fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie, Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose, Autoimmunerkrankungen, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Viruskrankheiten.  
Wann dürfen Sie 86 Arsen. sulfur. F Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?  
Wegen des Alkoholgehaltes soll 86 Arsen. sulfur. F Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**  
Warnhinweis: Dieses Arzneimittel enthält 52,3 Vol.-% Alkohol.  
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,32 g Alkohol zugeführt.  
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten

sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.  
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?  
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:  
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.  
**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**  
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite  
**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**  
Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.  
**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite  
**Nebenwirkungen:**  
In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.  
Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. Bei der Anwendung des Arzneimittels können Schüttelfrost, kurzfristige Fieberreaktionen, Übelkeit und Erbrechen auftreten. In diesen Fällen ist das Arzneimittel abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.  
Hinweis: siehe Rückseite.  
**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** siehe Rückseite  
**Stand der Information:** November 2017