Zubereitung

Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung oder Aufbewahrung des zubereiteten Fläschchens über einen längeren Zeitraum kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zubereiten und sofort füttern. Wichtig: Fläschchen auf Trinktemperatur (37° C) abkühlen (Verbrühungsgefahr). Nahrungsreste nicht wiederverwenden.

Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Milchnahrungen nicht in der Mikrowelle erwärmen (Verbrühungsgefahr). Die geöffnete Dose nach Produktentnahme wieder gut verschließen, kühl und trocken lagern und innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen



Benötiate Wassermenge abkochen und auf 70° C abkühlen lassen (oder Humana Baby-Wasser auf 70° C erwärmen)



2 Etwa die Hälfte der benötigten Wassermenge in eine gereinigte Flasche füllen



3 Beigefügter Humana-Mess löffel locker füller und mit einem Messerrücken o ä, abstreifen Erforderliche Pulvermenge in



4 Flasche verschlie Ben und sofort kräftig schüttelr Restliche Menge Wasser hinzuge ben und die Flasche nochmals kräftig schütteln Achtung: Hände vor heißer Flasche schützen (Tuch benutzen).



5 Nahrung auf

Trinktemperatur

Wasserbad oder

abkühlen: im

unter fließend

kaltem Wasser

(ca. 5-7 Min.).

6 Flasche noch einmal kurz befestigen und Inhalt erneut auf Trinktemperatur



schütteln, Sauger (37° C) überprüfen (Verbrühungs-



Nahruna für Säualinae mit niedrigem Geburtsgewicht über 1800 a (Frühgeborene)

*diätetisches Lebensmittel nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden

✓ mit LCP

mit GOS

mit Nukleotiden



Wichtige Hinweise für die Mutter

400 g

Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby, Sprechen Sie bitte mit Ihrer Klinik oder Ihrem Kinderarzt, wenn Sie eine Säuglingsnahrung verwenden wollen.

Der natürliche Vorteil der Muttermilch-Ernährung muss in der speziellen Situation des untergewichtigen Säuglings (Frühgeborenen) durch ein weiteres Nahrungsangebot ergänzt oder auf Anraten des Arztes voll ersetzt werden. wenn nicht gestillt werden kann

Humana 0 enthält leicht verfügbare Kohlenhydrate, bei Störungen der Glucosetoleranz nur unter ständiger Stoffwechselkontrolle verwenden. Nicht verwenden bei nachgewiesener Kuhmilchproteinallergie. Lactose-Intoleranz. Glucose-Galactose-Malabsorption und Galactosämie. Nicht zur parenteralen Frnährung geeignet

Trinkmenge & Dosierung

Bitte verwenden Sie nur den beigefügten Messlöffel (fasst ca. 5.1 g).

Zubereitung pro Mahlzeit Jedes Baby ist Wasser (ml) Messlöffel Trinkfertige Nahrung (ml) anders und so können die 35 angegebenen 65 60 Trinkmengen 100 nur Richtwerte 120 130 150 170

Die Dosierung und die Fütterungsdauer richten sich nach Anweisung des Arztes und nach der Gewichtsentwicklung und dem Alter des Säuglings. Die empfohlene, durchschnittliche Trinkmenge für ein Frühchen beträgt 140 ml pro kg Körpergewicht und Tag, die auf ca. 5-10 Mahlzeiten pro Tag verteilt werden. Wir empfehlen die Verwendung von Humana 0 bis zu einem Gewicht von ca. 5 kg.

Zutaten: Entrahmte Milch, entmineralisiertes Molkenpulver, pflanzliche Öle (enthält Sojalecithin), Maltodextrin, Galacto-Oligosaccharidsirup, Molkenproteinkonzentrat, Calciumorthophosphate, Calciumcarbonat, tierisches Öl (Fischöl), Kaliumchlorid, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Vitamin B₁, Vitamin B₂, Vitamin B₆, Folsäure, Vitamin K₁, Biotin, Vitamin D₃, Vitamin B₁₂), Natriumcitrat, Natriumchlorid, Inositol, Magnesiumcarbonat, Cholinhydrogentartrat, Taurin, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Inosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), Eisensulfat, Stabilisator: L(+)-Milchsäure. Zinkoxid. L-Carnitin. Kupferlysinkomplex. Kaliumjodat, Mangansulfat, Natriummolybdat, Natriumselenat, Chromohlorid.

Brennwert

Lactose Maltose Dextrine

dayon: gesättigte Fettsäuren

einfach ungesättigte 9.4 1.4 nehrfach ungesättigte inolensäure

Arachidonsäure mo Docosahexansäure mö 114 Ballaststoffe

Galacto-Oligosaccharide (GOS)

Aineralstoffe

Spurenelemente

itamin itamin B itamin i Niacin Pantothensäure Folsäure

Nukleotide

Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.



Experten-Service Für medizinische Fachfragen Mo.-Fr. 9-17 Uhr 05221 181-61555 expertenservice@humana.de

Anwenduna

Humana 0 ist eine Spezialnahrung für Säuglinge mit niedrigem Geburtsgewicht (Frühgeborene) über 1800 g als Ergänzung zur Muttermilch oder als alleinige Nahrung. Die Nahrungs-zusammensetzung ist ausgerichtet auf den erhöhten Protein-, Calcium- und Energiebedarf sowie auf die noch unreife Verdauung in dieser frühen Entwicklungsphase. Humana 0 kann nach Bedarf und ärztlicher Absprache von Geburt an bis zu einem Gestationsalter von 40-52 Wochen gefüttert werden.

LCP: langkettige, mehrfach unge-sättigte Omega 3- und 6-Fettsäuren, wie sie in der Muttermilch vorkommen. Besonders wichtig, da der Säugling sie in den ersten Lebensmonaten noch nicht ausreichend selbst produzieren

GOS: wichtige Ballaststoffe, wie sie auch in der Muttermilch vorkommen

Nahrung für Säuglinge mit niedrigem Geburtsgewicht über 1800 g (Frühgeborene)

Inhalt 400 ge

Humana GmbH 32046 Herford

Mindestens haltbar bis: siehe Dosenboden Unter Schutzatmosphäre verpackt Bitte kühl und trocken lagern

