

Client	MILCHWERKE	N°Dossier	36836N_	N° JH	JH11065A	N° XMC		Reception CD n° R3600028
N°GR / N° GV	36836N MILCHWERKE_GR2729601	Référence	6231M08B	N° XBG		N° CCV	CV0280001	
Opérateur	KD	Date	01/09/2014	Couleurs	PANTONE 288 - PANTONE 3135 - Magenta - Yellow - DECOUPE - - - -			

JH11065A

### ZUTATEN

Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Sonnenblumen- und Kokosöl), Maisstärke, hydrolysierte Milchproteine, Tricalciumphosphat, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Calciumcitrat, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, L-Cystin, Vitamine (C, E, A, Niacin, Pantothensäure, B<sub>2</sub>, B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub>, Folsäure, K<sub>1</sub>, Biotin, D<sub>3</sub>, B<sub>12</sub>), Dikaliumphosphat, Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Taurin, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Inositol, Zinksulfat, L-Carnitin, Antioxidationsmittel (Tocopherole), Natriumselenit, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Mangansulfat.

\* Die Proteinquelle in **Novalac Allernova** ist Kuhmilch.

### ZUBEREITUNG

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.



1 Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu.



2 Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren.



3 Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen lassen. Oder kohlensäurearmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen.



4 Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.



5 Entsprechende Anzahl gestrichener nicht gehäufeter – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.



6 Flasche schließen und schütteln, bis das Milchpulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.



7 Temperatur (37 °C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

Wichtig: Für eine gute Löslichkeit des Pulvers bei 40°C zubereiten

Novalac Allernova ist eine andickende Spezialnahrung. Möglicherweise müssen Sie Novalac Allernova mehr schütteln, um das Pulver aufzulösen. Für eine bessere Anwendung ist es möglich, einen Sauger mit regulierbarem Nahrungsfluss zu verwenden. Ohne die Gesundheit Ihres Babys zu beeinträchtigen kann es zu weniger festen oder grünlichen Stuhlgängen kommen.

# Novalac Allernova



400 g

Hypoallergene Spezialnahrung bei Kuhmilchallergie

0–36 Monate

Beratungshotline 0800-6682522 (kostenlos)  
www.novalac.de

### ZUSAMMENSETZUNG

im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung	100 kcal
<b>Energie</b>			
	kJ	2075,5	280,2
	kcal	496	67
<b>Fett</b> davon			
	g	26,2	3,5
- gesättigt	g	10,2	1,4
- einfach ungesättigt	g	9,5	1,3
- mehrfach ungesättigt	g	5,2	0,7
Linolsäure	g	4,5	0,6
α-Linolensäure	mg	450	60,8
<b>Kohlenhydrate</b> davon			
	g	52,7	7,1
- Zucker	g	0,0	0,0
<b>Eiweiß</b>	g	12,1	1,6
<b>Natrium</b>	g/mg	0,575/230	0,08/31,1
<b>Mineralstoffe</b>			
<b>Kalium</b>	mg	650	87,8
Chlorid	mg	340	45,9
<b>Calcium</b>	mg	520	70,2
Phosphor	mg	300	40,5
<b>Magnesium</b>	mg	50	6,8
Eisen	mg	6	0,8
<b>Zink</b>	mg	4	0,5
Jod	µg	70	9,5
<b>Kupfer</b>	µg	350	47,3
Mangan	µg	50	6,8
<b>Selen</b>	µg	10	1,4
Fluorid	µg	<350	<48
<b>Chrom</b>	µg	23	3,1
Molybdän	µg	23	3,1
<b>Vitamine</b>			
<b>A</b>	µg-RE	450	60,8
<b>B<sub>1</sub></b>	µg	400	54
<b>B<sub>2</sub></b>	µg	800	108
<b>B<sub>6</sub></b>	µg	300	40,5
<b>B<sub>12</sub></b>	µg	1,5	0,2
<b>C</b>	mg	60	8,1
<b>D<sub>3</sub></b>	µg	7,5	1,0
<b>E</b>	mg-α-TE	11	1,5
<b>K<sub>1</sub></b>	µg	30	4,1
Niacin	mg	4,5	0,6
<b>Pantothensäure</b>	mg	2,4	0,3
Folsäure	µg	60	8,1
<b>Biotin</b>	µg	15	2
<b>Cholin</b>	mg	60	8,1
Inositol	mg	25	3,4
<b>Taurin</b>	mg	44	5,9
L-Carnitin	mg	8	1,1

e 400 g

6231M08B

30105176



Unter Schutzatmosphäre verpackt.

### Qualität ohne Kompromisse

Novalac stellt höchste Qualitätsansprüche an die Herkunft der Inhaltsstoffe sowie deren Verarbeitung. Im Zentrum der Novalac Forschung stehen mit einer jahrzehnte langen Erfahrung und Kompetenz in der pädiatrischen Ernährungswissenschaft, die Entwicklung und das optimale Wachstum von Babys.

Novalac Allernova ist Teil eines individuellen Sortiments von Säuglingsmilchnahrungen, die auf den gesamten Ernährungsbedarf von Säuglingen in den verschiedenen Entwicklungsphasen und deren besonderen Anforderungen abgestimmt sind.

### ANWENDUNG

Novalac Allernova ist eine andickende, hypoallergene Spezialnahrung, mit stark (extensiv) hydrolysiertem Milcheiweiß (Casein), welche speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Neugeborenen und Säuglingen mit Kuhmilchallergie abgestimmt ist, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird. Diese ist nach Sicherung der Diagnose bereits in den ersten Lebenstagen einsetzbar. Novalac Allernova ist lactosefrei und glutenfrei.

### DOSIERUNG

Alter (Monate)	0–1	1–2	2–3	3–4	4–6	>6
Säuglingsgewicht (kg)	4	5	6	6,5	7	>7,5
Anzahl Flaschen pro Tag	6–7	5	5	5	4	3*
Anzahl Messlöffel	3–4	4	4–5	6	6–7	7
Abgekochtes Wasser (ml)	90–120	120	120–150	180	180–210	210

\*bei zusätzlicher Nahrungsaufnahme

Standardauflösung: 13,5 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.

1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,5 g Allernova.

Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Mengen und Anzahl aller Tagesmahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Bitte halten Sie die Dosierungsempfehlungen genau ein. Falsche Zubereitung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

### WICHTIGE HINWEISE

Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Novalac Allernova ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke zur diätetischen Behandlung von Kuhmilchallergie und nur unter medizinischer Kontrolle anzuwenden. Novalac Allernova ist nicht für die Ernährung von gesunden Säuglingen geeignet. Novalac Allernova ist geeignet zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen bis zum 6. Lebensmonat mit Kuhmilchallergie. Ab dem 6. Monat sollte Novalac Allernova in Absprache mit Ihrem Kinderarzt mit Breimahlzeiten kombiniert werden. Es wird empfohlen, besonders potentiell allergene Nahrungsbestandteile wie Eier, Fisch oder Fleisch später in die Ernährung Ihres Babys einzuführen. Bitte führen Sie keine Lebensmittel, die Milcheiweiß enthalten (Cerealien mit Milch, Milchprodukte, ...) ohne die Absprache mit Ihrem Kinderarzt in die Ernährung Ihres Babys ein. Novalac Allernova nicht anwenden bei Galactosämie und bei Glucose- und/oder Galactose-Malabsorption.

Verwenden Sie für Ihr Baby nach Rücksprache mit dem Kinderarzt bei einer Frühgeburt oder geschwächtem Immunsystem nur geeignete Spezialnahrungen.

### SICHERHEITSHINWEISE

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck.
- Nach Öffnung der Packung innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Nach Gebrauch gut verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.

Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung von Kuhmilchallergie.

Ein Produkt von **UP Euronord SA**  
ICC, Route de Pré-Bois 20, Case Postale 1876  
1215 Genf – Schweiz

Vertrieb durch **careforce pharma GmbH**  
Horbellner Straße 11, D-50858 Köln  
www.novalac.de